

PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg kanabidiolu.

Pomocné látky so známym účinkom

Jeden ml roztoku obsahuje:

79 mg bezvodého etanolu

736 mg rafinovaného sezamového oleja

0,0003 mg benzylalkoholu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok

Číry, bezfarebný až žltý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epidyolex je indikovaný na použitie ako adjuvantná liečba záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom (LGS) alebo Dravetovej syndrómom (DS) v kombinácii s klobazámom u pacientov vo veku od 2 rokov.

Epidyolex je indikovaný na použitie ako adjuvantná liečba záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) u pacientov vo veku od 2 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu Epidyolexom majú začať a viesť lekári so skúsenosťami s liečbou epilepsie.

Dávkovanie

Pri LGS a DS

Odporúčaná začiatková dávka kanabidiolu je 2,5 mg/kg užívaná dvakrát denne (5 mg/kg/deň) po dobu jedného týždňa. Po prvom týždni sa má dávka zvýšiť na udržiavaciu dávku 5 mg/kg dvakrát denne (10 mg/kg/deň). Na základe individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti sa môže každá dávka ďalej týždenne zvyšovať o 2,5 mg/kg podávaných dvakrát denne (5 mg/kg/deň) až do maximálnej odporúčanej dávky 10 mg/kg/deň dvakrát denne (20 mg/kg/deň).

Akkoľvek zvýšenie dávky nad 10 mg/kg/deň až do maximálnej odporúčanej dávky 20 mg/kg/deň sa má vykonať s ohľadom na individuálny prínos a riziko pri dodržiavaní úplného rozvrhu sledovania (pozri časť 4.4).

Pri TSC

Odporúčaná začiatková dávka kanabidiolu je 2,5 mg/kg užívaná dvakrát denne (5 mg/kg/deň) po dobu jedného týždňa. Po prvom týždni sa má dávka zvýšiť na 5 mg/kg dvakrát denne (10 mg/kg/deň) a má sa vyhodnotiť klinická odpoveď a znášanlivosť. Na základe individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti sa môže každá dávka ďalej týždenne zvyšovať o 2,5 mg/kg podávaných dvakrát denne (5 mg/kg/deň) až do maximálnej odporúčanej dávky 12,5 mg/kg dvakrát denne (25 mg/kg/deň).

Akékoľvek zvýšenie dávky nad 10 mg/kg/deň až do maximálnej odporúčanej dávky 25 mg/kg/deň sa má vykonať s ohľadom na individuálny prínos a riziko pri dodržiavaní úplného rozvrhu sledovania (pozri časť 4.4).

Odporúčania týkajúce sa dávky pre LGS, DS a TSC sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 1: Odporúčania týkajúce sa dávky

	LGS a DS	TSC
Začiatková dávka – prvý týždeň	2,5 mg/kg užívaných dvakrát denne (5 mg/kg/deň)	
Druhý týždeň	Udržiavacia dávka 5 mg/kg dvakrát denne (10 mg/kg/deň)	5 mg/kg dvakrát denne (10 mg/kg/deň)
Ďalšia titrácia podľa potreby (zvyšovanie)	Týždenné zvýšenia o 2,5 mg/kg podávaných dvakrát denne (5 mg/kg/deň)	
Maximálna odporúčaná dávka	10 mg/kg dvakrát denne (20 mg/kg/deň)	12,5 mg/kg dvakrát denne (25 mg/kg/deň)

Každá škatuľa Epidyolexu sa dodáva s:

- dvoma 1 ml striekačkami s 0,05 ml odstupňovaním (každé 0,05 ml zvýšenie zodpovedá 5 mg kanabidiolu),
- dvoma 5 ml striekačkami s 0,1 ml odstupňovaním (každé 0,1 ml zvýšenie zodpovedá 10 mg kanabidiolu).

Ak je vypočítaná dávka 100 mg (1 ml) alebo menej, má sa použiť menšia, 1 ml perorálna striekačka. Ak je vypočítaná dávka vyššia ako 100 mg (1 ml), má sa použiť väčšia, 5 ml perorálna striekačka.

Vypočítaná dávka sa má zaokrúhliť na najbližšie odstupňované zvýšenie.

Úpravy dávky iných liekov používaných v kombinácii s kanabidiolom

Na zvládnutie možných liekových interakcií má lekár so skúsenosťami s liečbou pacientov, ktorí sú súbežne liečení antiepileptikami, vyhodnotiť potrebu úpravy dávky kanabidiolu alebo súbežne používaného (používaných) lieku (liekov) (pozri časti 4.4 a 4.5).

Ukončenie liečby

Ak sa musí liečba kanabidiolom ukončiť, dávka sa má znižovať postupne. V klinickom skúšaní sa ukončenie liečby kanabidiolom dosiahlo znížením dávky o približne 10 % za deň počas 10 dní. Na základe klinickej indikácie môže byť podľa uváženia predpisujúceho potrebné pomalšie alebo rýchlejšie stitrovanie.

Vynechané dávky

V prípade jednej alebo viacerých vynechaných dávok sa vynechaná dávka nemá nahradiť.

V dávkovaní sa má pokračovať podľa existujúceho rozvrhu liečby. V prípade vynechaných dávok zodpovedajúcich viac ako 7 dňom podávania sa má vykonať opakovaná titrácia terapeutической dávky.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Klinické skúšania s kanabidiolom v liečbe LGS, DS a TSC nezahŕňali dostatočné množstvo pacientov starších ako 55 rokov na stanovenie toho, či na liečbu reagujú inak ako mladší pacienti.

Vo všeobecnosti sa má pri výbere dávky pre staršieho pacienta postupovať opatrne, zvyčajne začínajúc na nižšom konci dávkovacieho rozsahu, čo odzrkadľuje vyššiu frekvenciu zníženej pečenej, obličkovej alebo srdcovej funkcie a súčasného ochorenia alebo inej súbežnej liečby (pozri časti 4.4 pod hepatocelulárnym poškodením a 5.2).

Porucha funkcie obličiek

Kanabidiol sa môže podávať pacientom s miernou, stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek bez úpravy dávky (pozri časť 5.2). Skúsenosti u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek nie sú k dispozícii. Nie je známe, či je možné kanabidiol dialyzovať.

Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná žiadna úprava dávky kanabidiolu u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A).

U pacientov so stredne závažnou (Child-Pugh B) alebo závažnou (Child-Pugh C) (pozri časti 4.3 a 4.4) poruchou funkcie pečene sa má postupovať opatrne. U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča nižšia začiatková dávka. Pri titracii dávky sa má postupovať podľa údajov uvedených v tabuľke nižšie.

Tabuľka 2: Úprava dávky u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene

Porucha funkcie pečene	Začiatková dávka Pre LGS, DS a TSC	Udržiavacia dávka Pre LGS a DS	Druhý týždeň Pre TSC	Maximálna odporúčaná dávka Pre LGS a DS	Maximálna odporúčaná dávka Pre TSC
Stredne závažná	1,25 mg/kg dvakrát denne (2,5 mg/kg/deň)	2,5 mg/kg dvakrát denne (5 mg/kg/deň)		5 mg/kg dvakrát denne (10 mg/kg/deň)	6,25 mg/kg dvakrát denne (12,5 mg/kg/deň)
Závažná	0,5 mg/kg dvakrát denne (1 mg/kg/deň)	1 mg/kg dvakrát denne (2 mg/kg/deň)		2 mg/kg dvakrát denne (4 mg/kg/deň)*	2,5 mg/kg dvakrát denne (5 mg/kg/deň)*

*U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa môže zvážiť podávanie vyšších dávok kanabidiolu, keď možné prínosy prevažujú nad rizikami.

Pediatrická populácia

S LGS a DS

Použitie kanabidiolu sa netýka detí vo veku menej ako 6 mesiacov. Bezpečnosť a účinnosť kanabidiolu u detí vo veku 6 mesiacov až 2 roky rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

S TSC

Použitie kanabidiolu sa netýka detí vo veku menej ako 1 mesiac. Bezpečnosť a účinnosť kanabidiolu u detí vo veku 1 mesiac až 2 roky rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje u pacientov vo veku 1 až 2 roky sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Perorálne použitie

Jedlo môže zvýšiť hladiny kanabidiolu a preto sa má liek užívať konzistentne s jedlom alebo bez neho, vrátane ketogénnej diéty. Pri užívaní s jedlom sa má podľa možnosti zvážiť podobné zloženie jedla (pozri časť 5.2).

Odporúča sa perorálne podávanie, avšak v prípade potreby môžu byť nazogastrické a gastrostomické sondy prijateľnými spôsobmi enterálneho podávania.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia vyživovacích sond, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti s hladinami transamináz zvýšenými o viac než 3-násobok horného limitu normálnej hodnoty (ULN) a s hladinou bilirubínu zvýšenou o viac než 2-násobok ULN (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hepatocelulárne poškodenie

Kanabidiol môže spôsobiť zvýšené hladiny pečeňových transamináz (alanínaminotransferáza [ALT] a/alebo aspartátaminotransferáza [AST]) závislých od dávky (pozri časť 4.8). Zvýšenia sa typicky vyskytujú počas prvých dvoch mesiacov od začatia liečby, pozorovali sa však prípady až po 18 mesiacoch od začatia liečby, a to hlavne u pacientov súbežne užívajúcich valproát.

V klinických skúšaní sa väčšina zvýšení hladín ALT vyskytla u pacientov súbežne užívajúcich valproát. Súbežné používanie klobazámu tiež zvyšovalo výskyt zvýšených hladín transamináz, aj keď v menšom rozsahu ako valproát. Ak sa vyskytnú zvýšené hladiny transamináz, má sa zvážiť úprava dávky alebo ukončenie používania valproátu alebo úprava dávky klobazámu.

K upraveniu zvýšených hladín transamináz došlo pri ukončení liečby kanabidiolom alebo znížení dávky kanabidiolu a/alebo súbežne podávaného valproátu v približne dvoch tretinách prípadov. V približne jednej tretine prípadov sa zvýšenie hladín transamináz upravilo počas pokračujúcej liečby kanabidiolom bez zníženia dávky.

Pacienti s počiatočnými hladinami transamináz vyššími ako je ULN mali pri užívaní kanabidiolu vyššie miery zvýšených hladín transamináz. U niektorých pacientov viedol synergistický účinok súbežnej liečby valproátom na zvýšené počiatočné hladiny transamináz k vyššiemu riziku zvýšení hladín transamináz.

V nekontrolovanej štúdii u pacientov v rôznych iných ako epileptických indikáciách sa u 2 starších pacientov vyskytli zvýšené hladiny alkalickéj fosfatázy nad 2-násobok ULN v kombinácii so zvýšenými hladinami transamináz. Zvýšenia sa upravili po ukončení liečby kanabidiolom.

Sledovanie

Vo všeobecnosti sú zvýšené hladiny transamináz o viac než 3-násobok ULN v prítomnosti zvýšených hladín bilirubínu bez alternatívneho vysvetlenia dôležitým indikátorom ťažkého poškodenia pečene. Skorá identifikácia zvýšených hladín transamináz môže znížiť riziko závažného dôsledku. Pacienti s počiatočnými hladinami transamináz zvýšenými o viac ako 3-násobok ULN alebo zvýšenými hladinami bilirubínu o viac ako 2-násobok ULN, majú byť pred začatím liečby kanabidiolom vyhodnotení.

Pred začatím liečby kanabidiolom sa majú zmerať hladiny sérových transamináz (ALT a AST) a celkové hladiny bilirubínu.

Pravidelné sledovanie

Hladiny sérových transamináz a celkového bilirubínu sa majú merať 1 mesiac, 3 mesiace a 6 mesiacov po začatí liečby kanabidiolom a potom pravidelne alebo podľa klinickej indikácie.

Tento rozvrh sledovania sa má opätovne začať pri zmenách dávky kanabidiolu nad 10 mg/kg/deň alebo zmenách liekov (zmena dávky alebo pridanie lieku), pre ktoré je známe, že majú vplyv na pečeň.

Zvýšená frekvencia sledovania

U pacientov s identifikovanými zvýšenými počiatočnými hladinami ALT alebo AST a u pacientov, ktorí užívajú valproát, sa majú zisťovať hladiny sérových transamináz a celkového bilirubínu 2 týždne, 1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace a 6 mesiacov po začatí liečby kanabidiolom a potom pravidelne alebo podľa klinickej indikácie. Tento rozvrh sledovania sa má opätovne začať pri zmenách dávky kanabidiolu nad 10 mg/kg/deň alebo zmenách liekov (zmena dávky alebo pridanie lieku), pre ktoré je známe, že majú vplyv na pečeň.

Ak sa u pacienta vyvinú klinické prejavy alebo príznaky naznačujúce dysfunkciu pečene, majú sa neodkladne zmerať hladiny sérových transamináz a celkového bilirubínu a liečba kanabidiolom sa má podľa vhodnosti prerušiť alebo ukončiť. Liečba kanabidiolom sa má ukončiť u všetkých pacientov so zvýšenými hladinami transamináz vyššími ako 3-násobok ULN a hladinami bilirubínu vyššími ako 2-násobok ULN. Liečba sa má ukončiť aj u pacientov s pretrvávajúcimi zvýšenými hladinami transamináz vyšším ako 5-násobok ULN. Pacienti s dlhodobými zvýšenými hladinami sérových transamináz sa majú vyhodnotiť ohľadne ďalších možných príčin. Má sa zvážiť úprava dávky každého súbežne podávaného lieku, pre ktorý je známe, že má vplyv na pečeň (napr. valproát a klobazám) (pozri časť 4.5).

Somnolencia a sedácia

Kanabidiol môže spôsobiť somnolenciu a sedáciu, ktoré sa častejšie vyskytujú v skorých štádiách liečby a s pokračujúcou liečbou môžu vymiznúť. Výskyt bol vyšší u pacientov, ktorí súbežne užívali klobazám (pozri časti 4.5 a 4.8). Iné depresíva CNS, vrátane alkoholu, môžu zosilniť účinok somnolencie a sedácie.

Zvýšená frekvencia výskytu epileptických záchvatov

Tak, ako pri iných antiepileptikách, počas liečby kanabidiolom sa môže vyskytnúť klinicky významné zvýšenie frekvencie výskytu epileptických záchvatov, pri ktorom sa môže vyžadovať úprava dávky kanabidiolu a/alebo súbežne používaných antiepileptík alebo ukončenie liečby kanabidiolom, ak je pomer prínosu a rizika negatívny. V klinických skúšaníach fázy 3 skúmajúcich LGS, DS a TSC bola pozorovaná frekvencia výskytu status epilepticus podobná medzi kanabidiolom a skupinami s placebom.

Samovražedné správanie a myšlienky

U pacientov liečených antiepileptikami sa v niekoľkých indikáciách hlásilo samovražedné správanie a myšlienky. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaní s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika výskytu samovražedného správania a myšlienok. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pre kanabidiol.

U pacientov sa majú sledovať prejavy samovražedného správania a myšlienok a má sa zvážiť príslušná liečba. Pacientov a ošetrovateľov treba upozorniť, aby pri výskyte akýchkoľvek prejavov samovražedného správania a myšlienok vyhľadali lekársku pomoc.

Pokles telesnej hmotnosti

Kanabidiol môže viesť k poklesu telesnej hmotnosti alebo zníženiu prírastku telesnej hmotnosti (pozri časť 4.8). U pacientov s LGS, DS a TSC sa to zdalo byť závislé od dávky. V niektorých prípadoch sa pokles telesnej hmotnosti hlásil ako nežiaduci účinok. Znížená chuť do jedla a pokles telesnej hmotnosti môžu viesť k mierne spomalenému rastu do výšky. Pokračujúci pokles telesnej hmotnosti/chýbajúci prírastok telesnej hmotnosti sa majú pravidelne kontrolovať na vyhodnotenie toho, či sa má v liečbe kanabidiolom pokračovať.

Pomocné látky so známym účinkom

Sezamový olej

Tento liek obsahuje rafinovaný sezamový olej, ktorý zriedkavo môže vyvolať závažné alergické reakcie.

Benzylalkohol

Tento liek obsahuje 0,0003 mg/ml benzylalkoholu, čo zodpovedá 0,0026 mg na maximálnu dávku Epidyolexu (Epidyolex 12,5 mg/kg na dávku (TSC) pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg). Benzylalkohol môže spôsobiť alergické reakcie.

Vysoké množstvá sa majú používať s opatnosťou a len ak je to nevyhnutné, najmä u osôb s poruchou funkcie pečene alebo obličiek kvôli riziku akumulácie a toxicity (metabolická acidóza).

Etanol

Jeden ml Epidyolexu obsahuje 79 mg etanolu, čo zodpovedá 10 % v/v bezvodného etanolu, t.j. až 691,3 mg etanolu na maximálnu jednorazovú dávku Epidyolexu (12,5 mg/kg) pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg (9,9 mg etanolu/kg). Pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg to zodpovedá 17 ml piva alebo 7 ml vína na dávku.

Neskúmané populácie

Pacienti s klinicky významnou kardiovaskulárnou poruchou neboli zahrnutí do programu klinického vývoja TSC.

4.5 Liekové a iné interakcie

Induktory CYP3A4 alebo CYP2C19

Rifampicín, látka silno indukujúca CYP3A4/2C19 (600 mg podávaných jedenkrát denne) znížila plazmatické koncentrácie kanabidiolu a 7-hydroxy-kanabidiolu (7-OH-CBD, aktívny metabolit kanabidiolu) približne o 30 % a 60 %, v uvedenom poradí. Ďalšie silné induktory CYP3A4 a/alebo CYP2C19 ako je karbamazepín, enzalutamid, mitotán a ľubovník bodkovaný môžu pri súbežnom podávaní s kanabidiolom spôsobiť zníženie plazmatických koncentrácií kanabidiolu a 7-OH-CBD v podobnej miere. Tieto zmeny môžu viesť k zníženiu účinnosti kanabidiolu. Môže byť potrebná úprava dávky.

Inhibítory UGT

Kanabidiol je substrátom pre UGT1A7, UGT1A9 a UGT2B7. S kanabidiolom v kombinácii s inhibítormi UGT sa neuskutočnili žiadne formálne liekové interakčné štúdie, preto sa má pri súbežnom podávaní liekov, ktoré sú známymi inhibítormi týchto UGT, postupovať opatrne. Pri podávaní v kombinácii môže byť potrebné zníženie dávky kanabidiolu a/alebo inhibítora.

Súbežná liečba antiepileptikami

Farmakokinetické vlastnosti kanabidiolu sú komplexné a môžu spôsobiť interakcie so súbežnými antiepileptickými liečbami pacienta. Kanabidiol a/alebo súbežne používané antiepileptické liečby sa majú preto nastaviť počas pravidelných kontrol a pacienta je potrebné pozorne sledovať ohľadne

výskytu nežiaducich liekových reakcií. Okrem toho sa má zvážiť sledovanie plazmatických koncentrácií.

Potenciál liekových interakcií pre klobazám, valproát, stiripentol a everolimus s inými súbežne používanými antiepileptikami sa vyhodnocoval u zdravých dobrovoľníkov a pacientov s epilepsiou.

Klobazám

Pri súbežnom podávaní kanabidiolu a klobazámu dochádza k obojsmerným farmakokinetickým interakciám. Na základe štúdie u zdravých dobrovoľníkov sa môžu pri kombinácii s kanabidiolom vyskytnúť zvýšené hladiny (3 až 4-násobne) N-demetylklobazámu (aktívny metabolit klobazámu), pravdepodobne sprostredkované inhibíciou CYP2C19, so žiadnym účinkom na koncentrácie klobazámu. Okrem toho sa vyskytla zvýšená expozícia 7-OH-CBD, pre ktorý sa hodnota plazmatickej plochy pod krivkou (AUC) zvýšila o 47 % (pozri časť 5.2). Zvýšené systémové hladiny týchto liečiv môžu viesť k zosilneným farmakologickým účinkom a k zvýšeniu výskytu nežiaducich liekových reakcií. Súbežné užívanie kanabidiolu a klobazámu zvyšuje frekvenciu výskytu somnolencie a sedácie v porovnaní s placebom (pozri časti 4.4 a 4.8). Ak sa pri súbežnom podávaní klobazámu s kanabidiolom vyskytne somnolencia alebo sedácia, má sa zvážiť zníženie dávky klobazámu.

Valproát

Súbežné používanie kanabidiolu a valproátu zvyšuje frekvenciu výskytu zvýšených hladín transaminázových enzýmov (pozri časť 4.8). Mechanizmus tejto interakcie ostáva neznámy. Ak sa vyskytnú klinicky významné zvýšenia hladín transamináz, má sa u všetkých pacientov znížiť dávka kanabidiolu a/alebo súbežne užívaného valproátu, až kým sa nepozoruje úprava zvýšených hladín transamináz. Na vyhodnotenie rizika súbežného podávania iných hepatotoxických liekov a kanabidiolu nie je k dispozícii dostatočné množstvo údajov (pozri časť 4.4).

Súbežné podávanie kanabidiolu a valproátu zvyšuje frekvenciu hnačky a príhod zníženej chuti do jedla. Mechanizmus tejto interakcie nie je známy.

Stiripentol

Pri kombinácii kanabidiolu so stiripentolom došlo pri skúšaní so zdravými dobrovoľníkmi k zvýšeniu hladín stiripentolu o 28 % pre maximálnu nameranú plazmatickú koncentráciu ($C_{\max}$) a o 55 % pre hodnotu AUC. U pacientov bol však účinok slabší, so zvýšením hladín stiripentolu o 17 % pre hodnotu $C_{\max}$ a o 30 % pre hodnotu AUC. Klinický význam týchto výsledkov sa neskúmal. Pacientov treba pozorne sledovať ohľadne výskytu nežiaducich liekových reakcií.

Everolimus

Súbežné podávanie kanabidiolu (12,5 mg/kg dvakrát denne) so substrátom P-gp a CYP3A4 everolimusom (5 mg) v štúdiu so zdravými dobrovoľníkmi viedlo k zvýšeniu expozície everolimusu približne 2,5-násobne pre obe hodnoty, $C_{\max}$ aj AUC. Za mechanizmus tejto interakcie sa považuje inhibícia črevného efluxu P-gp vedúca k zvýšenej biologickej dostupnosti everolimusu, pretože kanabidiol nemal žiadny účinok na expozíciu midazolamu v inej interakčnej štúdiu. Počas everolimusu nebol ovplyvnený, čo potvrdzuje chýbajúce systémové inhibičné účinky kanabidiolu na aktivitu P-gp a CYP3A4. Pri začatí liečby kanabidiolom u pacientov užívajúcich everolimus sa majú sledovať terapeutické hladiny lieku pre everolimus a dávka sa má príslušne upraviť. Pri začatí liečby everolimusom u pacientov užívajúcich stabilnú dávku kanabidiolu sa odporúča nižšia začiatková dávka everolimusu so sledovaním terapeutической hladiny lieku.

Potenciál kanabidiolu ovplyvňovať iné lieky

Substráty citlivé na CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A9 a UGT2B7

Substráty citlivé na CYP1A2

Údaje *in vivo* získané pri podávaní kanabidiolu v ustálenom stave (750 mg dvakrát denne) pri súbežnom podaní s jednorazovou dávkou kofeínu (200 mg), substrátu citlivého na CYP1A2, preukázali zvýšenú expozíciu kofeínu o 15 % pre hodnotu $C_{\max}$ a 95 % pre hodnotu AUC v porovnaní s podávaním samotného kofeínu. Tieto údaje naznačujú, že kanabidiol je slabým inhibítorom CYP1A2. Podobné mierne zvýšenia expozície sa môžu pozorovať s inými substrátmi citlivými na

CYP1A2 (napr. teofylín alebo tizanidín). Klinický význam týchto zistení sa neskúmal. Pacienta treba pozorne sledovať ohľadne výskytu nežiaducich liekových reakcií.

Substráty citlivé na CYP2B6

Súbežné podávanie kanabidiolu (7,5 mg/kg dvakrát denne) s jednorazovou dávkou bupropiónu (150 mg), substrátu citlivého na CYP2B6, znížilo expozíciu bupropiónu o 19 % pre $C_{\max}$ a 20 % pre AUC (v porovnaní s bupropiónom podávaným samostatne), čo je v rámci pozorovanej variability, a preto to nie je klinicky významné. Zmeny v expozíciách substrátov CYP2B6 nie sú známe pri súbežnom používaní s kanabidiolom v dávkach nad 7,5 mg/kg dvakrát denne.

Substráty citlivé na CYP2C8

Pri výskyte nežiaducich reakcií pri súbežnom podávaní s kanabidiolom sa má z dôvodu možnej inhibície enzymatickej aktivity a podľa klinickej vhodnosti zvážiť zníženie dávky substrátov CYP2C8.

Substráty citlivé na CYP2C9

Súbežné podávanie kanabidiolu (7,5 mg/kg dvakrát denne) s jednorazovou dávkou tolbutamidu (500 mg) (substrát stredne citlivý na CYP2C9) neviedlo k zmenám v plazmatickej koncentrácii tolbutamidu v porovnaní s tolbutamidom podávaným samostatne. Pri podávaní kanabidiolu (12,5 mg/kg dvakrát denne) v rovnovážnom stave so súbežným podaním jednorazovej dávky tolbutamidu (500 mg) sa predpokladajú podobné hodnoty $C_{\max}$ a AUC tolbutamidu v porovnaní s tými, keď sa tolbutamid podával samostatne. Nie je potrebná úprava dávky liečiv, ktoré sú substrátmi CYP2C9 (napr. fenytoín), keď sa podávajú súbežne s kanabidiolom.

Substráty citlivé na CYP2C19

Údaje *in vitro* preukázali, že kanabidiol inhibuje CYP2C19, čo môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú metabolizované týmto izoenzýmom, ako sú klobazám a omeprazol. Pri súbežne podávaných liekoch, ktoré sú substrátmi citlivými na CYP2C19 alebo ktoré majú úzky terapeutický index, sa má zvážiť zníženie dávky.

Substráty citlivé na UGT1A9

Súbežné podávanie kanabidiolu (7,5 mg/kg dvakrát denne) s jednorazovou dávkou mykofenolát mofetilu (1 500 mg) zvýšilo expozíciu kyseline mykofenolovej (substrát citlivý na UGT1A9) o 16 % pre $C_{\max}$ a 35 % pre AUC. Pri súbežnom podávaní mykofenolát mofetilu (1 500 mg) s podávaním kanabidiolu (12,5 mg/kg dvakrát denne) v rovnovážnom stave sa predpokladá zvýšenie expozície kyseline mykofenolovej o 9 % pre $C_{\max}$ a 58 % pre AUC. Pri súbežnom používaní s kanabidiolom sa môžu pozorovať zvýšenia koncentrácie substrátov UGT1A9. Zvážte zníženie dávky substrátov citlivých na UGT1A9, ako je kyselina mykofenolová, kde už malé zmeny koncentrácie môžu viesť k závažným nežiaducim reakciám. Dávkovanie upravte na základe klinického úsudku.

Substráty citlivé na UGT2B7

Súbežné podávanie kanabidiolu (7,5 mg/kg dvakrát denne) s jednorazovou dávkou zidovudínu (300 mg), substrátu citlivého na UGT2B7, zvýšilo expozíciu zidovudínu o 7 % pre $C_{\max}$ a 19 % pre AUC (v porovnaní s podávaním samotného zidovudínu), čo podľa očakávania nebude klinicky významné. Pri súbežnom podávaní zidovudínu s podávaním kanabidiolu (12,5 mg/kg dvakrát denne) v rovnovážnom stave sa nepredpokladajú žiadne klinicky významné zmeny v plazmatických expozíciách zidovudínu. Nie je potrebná úprava dávky liečiv, ktoré sú substrátmi UGT2B7 (napr. lamotrigín), keď sa podávajú súbežne s kanabidiolom.

Vyhodnotenie in vitro liekových interakcií s enzýmami UGT

Metabolit 7-karboxy-kanabidiol (7-COOH-CBD) je inhibítorom aktivity sprostredkovanej UGT1A1, UGT1A4 a UGT1A6 *in vitro*. Pri súbežnom podávaní kanabidiolu so substrátmi týchto UGT môže byť potrebné zníženie dávky týchto substrátov.

Substráty citlivé na P-gp podávané perorálne

Súbežné podávanie kanabidiolu s perorálne podávaným everolimusom, substrátom P-gp a CYP3A4 zvýšilo biologickú dostupnosť pravdepodobne z dôvodu inhibície črevného efluxu P-gp everolimusu. Pri súbežnom podávaní s kanabidiolom sa môže vyskytnúť zvýšenie expozícií iných perorálne

podávaných substrátov citlivých na P-gp (napr. sirolimus, takrolimus alebo digoxín). Pri perorálnom podávaní a súbežnom podávaní s kanabidiolom sa má zväžiť sledovanie terapeutickú hladiny lieku a zníženie dávky iných substrátov P-gp.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Je iba obmedzené množstvo údajov o použití kanabidiolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Ako preventívne opatrenie sa kanabidiol nemá užívať počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre matku jasne neprevyšuje možné riziko pre plod.

Dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o prítomnosti kanabidiolu ani jeho metabolitov v ľudskom mlieku, účinkoch na dojčené dieťa ani účinkoch na tvorbu mlieka.

Štúdie na zvieratách preukázali toxikologické zmeny u laktujúcich zvierat, keď sa matke podával kanabidiol (pozri časť 5.3).

Štúdie ohľadne vylučovania kanabidiolu do materského mlieka u ľudí nie sú k dispozícii. Na základe skutočnosti, že kanabidiol sa značne viaže na proteíny a pravdepodobne voľne prechádza z plazmy do mlieka, má byť ako preventívne opatrenie dojčenie počas liečby ukončené.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch kanabidiolu na fertilitu u ľudí.

Pri perorálnej dávke až 150 mg/kg/deň kanabidiolu sa nezaznamenal žiadny účinok na reprodukčnú schopnosť u samcov ani samíc potkanov (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kanabidiol má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože môže spôsobovať somnolenciu a sedáciu (pozri časť 4.4). Pacientov treba upozorniť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, až kým nezískajú dostatočné skúsenosti na odhadnutie toho, či liek negatívne vplýva na ich schopnosti (pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Nežiaduce reakcie hlásené s kanabidiolom v odporúčanom rozsahu dávok 10 až 25 mg/kg/deň sú uvedené nižšie.

Najčastejšie nežiaduce reakcie sú somnolencia (23 %), znížená chuť do jedla (21 %), hnačka (20 %), pyrexia (16 %), vracanie (12 %) a únava (10 %).

Najčastejšími príčinami ukončenia liečby boli zvýšené hladiny transamináz (2 %), somnolencia (2 %) a znížená chuť do jedla (1 %).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie hlásené pre kanabidiol v placebom kontrolovaných klinických štúdiách sú uvedené v tabuľke nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu.

Frekvencie sú definované nasledujúco: veľmi časté ($\geq 1/10$), časté ($\geq 1/100$ až $< 1/10$), menej časté ($\geq 1/1\,000$ až $< 1/100$). V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 3: Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov	Frekvencia	Nežiaduce reakcie z klinických štúdií
Infekcie a nákazy	časté	pneumónia ^a infekcie močových ciest
Poruchy krvi a lymfatického systému	veľmi časté	znížená hladina hemoglobínu zníženie hematokritu
Poruchy metabolizmu a výživy	veľmi časté	znížená chuť do jedla
Psychiatrické poruchy	časté	podráždenosť agresia
Poruchy nervového systému	veľmi časté časté	somnolencia ^a letargia záchvaty
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína	časté	kašeľ
Poruchy gastrointestinálneho traktu	veľmi časté časté	hnačka vracanie nevoľnosť
Poruchy pečene a žlčových ciest	časté	zvýšené hladiny AST zvýšené hladiny ALT zvýšené hladiny GGT
Poruchy kože a podkožného tkaniva	časté	vyrážka
Poruchy obličiek a močových ciest	časté	zvýšená hladina kreatinínu v krvi
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania	veľmi časté	pyrexia únava
Laboratórne a funkčné vyšetrenia	časté	pokles telesnej hmotnosti

^a Zoskupené výrazy: **pneumónia**: pneumónia, RSV pneumónia, mykoplazmatická pneumónia, adenovírusová pneumónia, vírusová pneumónia, aspiračná pneumónia; **somnolencia**: somnolencia, sedácia.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Hepatocelulárne poškodenie

Kanabidiol môže spôsobiť zvýšené hladiny ALT a AST závislé od dávky (pozri časť 4.4).

V kontrolovaných štúdiách s LGS, DS (pacienti dostávajúci 10 alebo 20 mg/kg/deň) a s TSC (pacienti dostávajúci 25 mg/kg/deň) bol výskyt zvýšených hladín ALT nad 3-násobok ULN 12 % u pacientov liečených kanabidiolom v porovnaní s < 1 % u pacientov dostávajúcich placebo.

Menej ako 1 % pacientov liečených kanabidiolom malo hladiny ALT alebo AST vyššie ako 20-násobok ULN. Vyskytli sa prípady zvýšených hladín transamináz spojených s hospitalizáciou pacientov užívajúcich kanabidiol.

Rizikové faktory pre hepatocelulárne poškodenie

Súbežné užívanie valproátu a klobazámu, dávka kanabidiolu a počiatočné zvýšenia hladín transamináz

Súbežné užívanie valproátu a klobazámu

U pacientov liečených kanabidiolom dostávajúcich dávky 10, 20 a 25 mg/kg/deň bol výskyt zvýšených hladín ALT vyšších ako 3-násobok ULN 23 % u pacientov súbežne užívajúcich valproát aj klobazám, 19 % u pacientov súbežne užívajúcich valproát (bez klobazámu), 3 % u pacientov súbežne užívajúcich klobazám (bez valproátu) a 3 % u pacientov, ktorí neužívali žiadny z týchto dvoch liekov.

Dávka

Zvýšené hladiny ALT vyššie ako 3-násobok ULN sa hlásili u 15 % pacientov užívajúcich 20 alebo 25 mg/kg/deň kanabidiolu v porovnaní s 3 % pacientov užívajúcich 10 mg/kg/deň kanabidiolu. V kontrolovanej štúdii bolo pri TSC riziko zvýšenia hladín ALT vyššie pri dávkach vyšších ako 25 mg/kg/deň.

Počiatkové zvýšenia hladín transamináz

V kontrolovaných skúšaniach (pozri časť 5.1) u pacientov užívajúcich 20 alebo 25 mg/kg/deň kanabidiolu bola frekvencia zvýšení hladín ALT vyšších ako 3-násobok ULN spôsobených liečbou 29 % (80 % z týchto pacientov užívalo valproát), keď boli počiatkové hladiny ALT vyššie ako ULN, v porovnaní s 12 % (89 % z týchto pacientov užívalo valproát), keď boli počiatkové hladiny ALT v normálnom rozsahu. Celkom u 5 % pacientov (všetci užívali valproát) užívajúcich 10 mg/kg/deň kanabidiolu sa vyskytli zvýšené hladiny ALT vyššie ako 3-násobok ULN, keď bola počiatkové hladiny ALT vyššie ako ULN, v porovnaní s 3 % pacientov (všetci užívali valproát), u ktorých boli počiatkové hladiny ALT v rámci normálneho rozsahu.

Somnolencia a sedácia

V kontrolovaných skúšaniach LGS, DS a TSC s kanabidiolom sa pozorovali príhody somnolencie a sedácie (vrátane letargie) (pozri časť 4.4), vrátane 29 % pacientov liečených kanabidiolom (30 % pacientov užívajúcich 20 alebo 25 mg/kg/deň kanabidiolu a 27 % pacientov užívajúcich 10 mg/kg/deň kanabidiolu). Tieto nežiaduce reakcie sa v kontrolovanej štúdii pri TSC pozorovali s vyšším výskytom pri dávkach nad 25 mg/kg/deň. Miera výskytu somnolencie a sedácie (vrátane letargie) bola vyššia u pacientov súbežne liečených klobazámom (43 % u pacientov liečených kanabidiolom užívajúcich klobazám v porovnaní so 14 % u pacientov liečených kanabidiolom, ktorí neužívali klobazám).

Záchvaty

V kontrolovaných skúšaniach u pacientov s TSC sa pri dávkach 25 mg/kg/deň pozorovala zvýšená frekvencia nežiaducich udalostí spojených so zhoršením záchvatov. Aj keď sa nestanovil jasný obraz, nežiaduce udalosti odzrkadľovali zvýšenú frekvenciu alebo intenzitu záchvatov, alebo výskyt nových typov záchvatov. Frekvencia nežiaducich udalostí spojených so zhoršením záchvatov bola 11 % u pacientov užívajúcich 25 mg/kg/deň kanabidiolu a 18 % u pacientov užívajúcich dávky kanabidiolu vyššie ako 25 mg/kg/deň, v porovnaní s 9 % u pacientov užívajúcich placebo.

Pokles telesnej hmotnosti

Kanabidiol môže spôsobiť pokles telesnej hmotnosti alebo zníženie prírastku telesnej hmotnosti (pozri časť 4.4). U pacientov s LGS, DS a TSC sa pokles telesnej hmotnosti zdal byť závislý od dávky s 21 % pacientov užívajúcich 20 alebo 25 mg/kg/deň kanabidiolu, u ktorých sa vyskytol pokles telesnej hmotnosti o ≥ 5 % v porovnaní so 7 % pacientov užívajúcich 10 mg/kg/deň kanabidiolu. V niektorých prípadoch sa pokles telesnej hmotnosti hlásil ako nežiaduci účinok (pozri tabuľku 3 vyššie). Znížená chuť do jedla a pokles telesnej hmotnosti môžu viesť k mierne spomalenému rastu do výšky. prírastok

Hnačka

Kanabidiol môže spôsobiť hnačku závislú od dávky. V kontrolovaných skúšaniach s LGS a DS bola frekvencia hnačky 13 % u pacientov dostávajúcich 10 mg/kg/deň kanabidiolu a 21 % u pacientov dostávajúcich 20 mg/kg/deň kanabidiolu, v porovnaní s 10 % u pacientov dostávajúcich placebo. V kontrolovanom skúšaní s TSC bola frekvencia hnačky 31 % u pacientov dostávajúcich 25 mg/kg/deň kanabidiolu a 56 % u pacientov dostávajúcich dávky vyššie ako 25 mg/kg/deň kanabidiolu, v porovnaní s 25 % u pacientov dostávajúcich placebo.

V klinických skúšaniach bol prvý výskyt hnačky typicky v prvých 6 týždňoch liečby kanabidiolom. Medián trvania hnačky bol 8 dní. Hnačka viedla k zníženiu dávky kanabidiolu u 10 % pacientov, k dočasnému prerušeniu podávania u 1 % pacientov a k trvalému ukončeniu podávania u 2 % pacientov.

Hematologické abnormality

Kanabidiol môže pôsobiť znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu. U pacientov s LGS, DS a TCS bolo priemerné zníženie hladín hemoglobínu od počiatočného stavu po koniec liečby -0,36 g/dl u pacientov liečených kanabidiolom dostávajúcich 10, 20 alebo 25 mg/kg/deň. Pozorovalo sa tiež zodpovedajúce zníženie hematokritu s priemernou zmenou -1,3 % u pacientov liečených kanabidiolom.

U 27 % pacientov liečených kanabidiolom s LGS a DS a 38 % pacientov liečených kanabidiolom (25 mg/kg/deň) s TSC sa počas priebehu štúdie vyvinula nová, laboratórne definovaná anémia (definovaná ako normálne počiatočné koncentrácie hemoglobínu s hlásenými hodnotami nižšími ako dolný limit normálnej hodnoty v nasledujúcom časovom bode).

Zvýšenia hladín kreatinínu

Kanabidiol môže spôsobiť zvýšené hladiny sérového kreatinínu. Mechanizmus ešte nebol stanovený. V kontrolovaných štúdiách u zdravých dospelých a u pacientov s LGS, DS a TSC sa pozorovala zvýšená hladina sérového kreatinínu o približne 10 % do 2 týždňov od začiatku liečby kanabidiolom. Zvýšenie bolo u zdravých dospelých reverzibilné. V štúdiách s LGS, DS a TSC sa reverzibilita nevyhodnocovala.

Pneumónia

V kontrolovaných skúšaní s kanabidiolom sa pozorovali udalosti pneumónie u pacientov s LGS, DS alebo TSC vrátane 6 % pacientov liečených kanabidiolom v porovnaní s 1 % pacientov užívajúcich placebo.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na **národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#)**.

4.9 Predávkovanie

Príznaky

Skúsenosti s dávkami vyššími ako sú odporúčané terapeutické dávky sú obmedzené. U zdravých osôb užívajúcich jednorazovú dávku 6 000 mg sa hlásila mierna hnačka a somnolencia. Zodpovedá to dávke nad 85 mg/kg pre 70 kg dospelého. Tieto nežiaduce reakcie do ukončenia štúdie ustúpili.

Liečba predávkovania

V prípade predávkovania sa má pacient pozorovať a má sa mu podať vhodná symptomatická podporná liečba, vrátane sledovania životných funkcií.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká. ATC kód: N03AX24

Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus, ktorým kanabidiol vytvára antikonvulzívny účinok u ľudí, nie je známy. Kanabidiol neprejavuje svoj antikonvulzívny účinok prostredníctvom interakcie s kanabinoïdnými receptormi. Kanabidiol znižuje neuronálnu hyperexcitabilitu prostredníctvom modulácie kanálov intracelulárneho vápnikového receptora 55 s väzbou cez G proteín (GPR55) a vaniloidného

receptora 1 (TRPV-1), ako aj moduláciou signalizácie sprostredkovanej adenosínom cez inhibíciu bunkovej absorpcie adenosínu rovnovážnymi nukleozidovými transportérmi-1 (ENT-1).

Farmakodynamické účinky

U pacientov existuje potenciál aditívneho antikonvulzívneho účinku pochádzajúceho z obojsmernej farmakokinetickej interakcie medzi kanabidiolom a klobazámom, ktorý vedie z zvýšeniam cirkulujúcich hladín ich príslušných aktívnych metabolitov 7-OH-CBD (približne 1,5-násobne) a N-CLB (približne 3-násobne) (pozri časti 4.5, 5.1 a 5.2).

Klinická účinnosť

Doplnková liečba u pacientov s Lennox-Gastautovým syndrómom (LGS)

Účinnosť kanabidiolu pri doplnkovej liečbe epileptických záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom (LGS) sa hodnotila v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami (GWPCARE3 a GWPCARE4). Každá štúdia pozostávala zo 4-týždňového začiatočného obdobia, 2-týždňového titračného obdobia a 12-týždňového udržiavacieho obdobia. Priemerný vek študijnej populácie bol 15 rokov a 94 % počas skúšania súbežne užívalo 2 alebo viac antiepileptík. Najčastejšie súbežne používané antiepileptiká (> 25 % pacientov) v oboch skúšaní boli valproát, klobazám, lamotrigín, levetiracetam a rufinamid. Približne 50 % pacientov súbežne užívalo klobazám. Z pacientov, ktorí neužívali klobazám, väčšina predtým užívala a následne prerušila liečbu klobazámom.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola percentuálna zmena od počiatočnej hodnoty vo výskyte epileptických záchvatov s pádom za 28 dní počas liečebného obdobia pre skupinu s kanabidiolom v porovnaní s placebom. Epileptické záchvaty s pádom boli definované ako atonické, tonické alebo tonicko-klonické záchvaty, ktoré viedli alebo mohli viesť k pádu alebo zraneniu. Kľúčovými sekundárnymi koncovými ukazovateľmi bol pomer pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom, percentuálna zmena frekvencie výskytu celkových záchvatov od počiatočného stavu a celkový dojem pacienta/ošetrojúceho o zmene (*Subject/Caregiver Global Impression of Change*) pri poslednom vyšetrení.

Analýzy podskupín sa vykonali na rôznych faktoroch, vrátane súbežne užívaných antiepileptík. Výsledky analýz podskupín pacientov liečených klobazámom v porovnaní s pacientami liečenými bez klobazámu naznačovali, že existuje reziduálna štatistická neistota týkajúca sa liečebných účinkov kanabidiolu u pacientov, ktorí neužívali klobazám. V tejto populácii sa účinnosť nestanovila.

Tabuľka 4 zhŕňa primárny cieľový ukazovateľ percentuálneho zníženia výskytu epileptických záchvatov s pádom od počiatočného stavu a kľúčové sekundárne výsledky merania pomeru pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom, ako aj výsledky analýzy podskupín pre tieto výsledky meraní u pacientov súbežne liečených klobazámom.

Tabuľka 4: Primárne výsledky meraní a kľúčové sekundárne výsledky meraní ≥ 50 % pomeru reagujúcich na liečbu a analýzy podskupín v štúdiách LGS

		Celkovo	N	Podskupina s klobazámom	N
EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY S PÁDOM ZA 28 DNÍ					
Percentuálne zníženie od počiatočného stavu^a					
GWPCARE3	Placebo	17,2 %	76	22,7 %	37
	10 mg/kg/deň	37,2 %	73	45,6 %	37
	20 mg/kg/deň	41,9 %	76	64,3 %	36
GWPCARE4	Placebo	21,8 %	85	30,7 %	42
	20 mg/kg/deň	43,9 %	86	62,4 %	42
Zmena alebo percentuálne zníženie v porovnaní s placebom (95 % IS), hodnota p^b					
GWPCARE3	10 mg/kg/deň	19,2 (7,7; 31,2) p = 0,0016		29,6 % (2,4 %, 49,2 %) p = 0,0355 ^c	
	20 mg/kg/deň	21,6 (6,7; 34,8) p = 0,0047		53,8 % (35,7 %, 66,8 %) p < 0,0001 ^c	
GWPCARE4	20 mg/kg/deň	17,2 (4,1; 30,3) p = 0,0135		45,7 % (27,0 %, 59,6 %) p < 0,0001 ^c	
≥ 50 % ZNÍŽENIE VÝSKYTU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV S PÁDOM (ANALÝZA PACIENTOV REAGUJÚCICH NA LIEČBU)					
Percentuálna hodnota ≥ 50 % reagujúcich na liečbu, hodnota p^d					
GWPCARE3	Placebo	14,5 %	76	21,6 %	37
	10 mg/kg/deň	35,6 % p = 0,0030	73	40,5 % p = 0,0584 ^c	37
	20 mg/kg/deň	39,5 % p = 0,0006	76	55,6 % p = 0,0021 ^c	36
GWPCARE4	Placebo	23,5 %	85	28,6 %	42
	20 mg/kg/deň	44,2 % p = 0,0043	86	54,8 % P = 0,0140 ^c	42

IS = 95 % interval spoľahlivosti.

^a Údaje pre celkovú populáciu sú uvedené ako medián percentuálneho zníženia od počiatočnej hodnoty. Údaje pre podskupiny s klobazámom sú uvedené ako percentuálne zníženie od počiatočnej hodnoty odhadované z negatívnej binominálnej regresnej analýzy.

^b Celkové údaje sú uvedené ako odhadovaný medián rozdielu a hodnota p z Wilcoxonovho dvojvýberového (*rank-sum*) testu. Údaje pre podskupiny s klobazámom sú odhadované z negatívnej binominálnej regresnej analýzy.

^c Nominálna hodnota p.

^d Celková p-hodnota sa zakladá na Cochranovom-Mantelovom-Haenszelovom teste. Nominálne hodnoty p pre podskupiny s klobazámom sa zakladajú na logistickej regresnej analýze.

Ďalšie sekundárne hodnoty výsledkov v podskupine pacientov súbežne liečených klobazámom

Kanabidiol sa spájal so zvýšením percentuálnej hodnoty osôb so 75 % alebo väčším znížením frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom počas liečebného obdobia v každom skúšaní (11 % pre 10 mg/kg/deň kanabidiolu, 31 % až 36 % pre 20 mg/kg/deň kanabidiolu, 3 % až 7 % pre placebo).

V každom skúšaní mali pacienti dostávajúci kanabidiol väčšie percentuálne zníženie výskytu celkových epileptických záchvatov v porovnaní s placebom (53 % pre 10 mg/kg/deň, 64 % až 66 %

pre 20 mg/kg/deň, 25 % pre každú skupinu s placebom; $p = 0,0025$ pre 10 mg/kg/deň a $p < 0,0001$ pre každú skupinu s 20 mg/kg/deň oproti placebo).

Ošetrojúci a pacienti hlásili výraznejšie zlepšenie celkového stavu merané skóre celkového dojmu o zmene pri poslednom vyšetrení pri oboch dávkach kanabidiolu (76 % pre 10 mg/kg/deň, 80 % pre každú skupinu s 20 mg/kg/deň, 31 % až 46 % pre placebo; $p = 0,0005$ pre 10 mg/kg/deň a $p < 0,0001$ a 0,0003 pre 20 mg/kg/deň oproti placebo).

V porovnaní s placebom sa kanabidiol spájal so zvýšením počtu dní bez epileptických záchvatov s pádom počas liečebného obdobia v každom skúšaní, čo zodpovedá 3,3 dňom za 28 dní (10 mg/kg/deň) a 5,5 až 7,6 dňom za 28 dní (20 mg/kg/deň).

Adjuvantná liečba pacientov s Dravetovej syndrómom

Účinnosť kanabidiolu pri doplnkovej liečbe epileptických záchvatov spojených s Dravetovej syndrómom (DS) sa hodnotila v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami (GWPCARE2 a GWPCARE1). Každá štúdia pozostávala zo 4-týždňového začiatočného obdobia, 2-týždňového titračného obdobia a 12-týždňového udržiavacieho obdobia. Priemerný vek študijnej populácie bol 9 rokov a 94 % počas skúšania súbežne užívalo 2 alebo viac antiepileptík. Najčastejšie súbežne používané antiepileptiká (> 25 % pacientov) v oboch skúšaní boli valproát, klobazám, stiripentol a levetiracetam. Približne 65 % pacientov súbežne užívalo klobazám. Z pacientov, ktorí neužívali klobazám, väčšina predtým užívala a následne prerušila liečbu klobazámom.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola zmena frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov počas obdobia liečby (od 1. dňa až do konca vyhodnotiteľného obdobia) oproti počiatočnému stavu (GWPCARE2) a percentuálna zmena výskytu konvulzívnych záchvatov za 28 dní od začiatku štúdie počas obdobia liečby (GWPCARE1) v skupinách s kanabidiolom oproti placebo. Konvulzívne záchvaty sa definovali ako atonické, tonické, klonické a tonicko-klonické záchvaty. Kľúčovými sekundárnymi koncovými ukazovateľmi pre GWPCARE2 bol pomer pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov, zmena frekvencie výskytu celkových záchvatov a celkový dojem ošetrojúceho o zmene (*Caregiver Global Impression of Change*) pri poslednom vyšetrení. Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom pre GWPCARE1 bol pomer pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov.

Analýzy podskupín sa vykonali na rôznych faktoroch, vrátane súbežne užívaných antiepileptík. Výsledky analýz podskupín pacientov liečených klobazámom v porovnaní s pacientami liečenými bez klobazámu naznačovali, že existuje reziduálna štatistická neistota týkajúca sa liečebných účinkov kanabidiolu u pacientov, ktorí neužívali klobazám. V tejto populácii sa účinnosť nestanovila.

Tabuľka 5 zhŕňa primárny cieľový ukazovateľ percentuálneho zníženia výskytu konvulzívnych záchvatov od počiatočného stavu a kľúčové sekundárne výsledky merania pomeru pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov, ako aj výsledky analýzy podskupín pre tieto výsledky meraní u pacientov súbežne liečených klobazámom.

Tabuľka 5: Primárne výsledky meraní a kľúčové sekundárne výsledky meraní ≥ 50 % pomeru reagujúcich na liečbu a analýzy podskupín v štúdiách DS

		Celkovo	N	Podkupina s klobazámom	N
KONVULZÍVNE ZÁCHVATY ZA 28 DNÍ					
Percentuálne zníženie od počiatočného stavu^a					
GWPCARE2	Placebo	26,9 %	65	37,6 %	41
	10 mg/kg/deň	48,7 %	66	60,9 %	45
	20 mg/kg/deň	45,7 %	67	56,8 %	40
GWPCARE1	Placebo	13,3 %	59	18,9 %	38
	20 mg/kg/deň	38,9 %	61	53,6 %	40
Zmena alebo percentuálne zníženie v porovnaní s placebom (95 % IS), hodnota p^b					
GWPCARE2	10 mg/kg/deň	29,8 % (8,4 %, 46,2 %) p = 0,0095		37,4 % (13,9 %, 54,5 %) p = 0,0042 ^c	
	20 mg/kg/deň	25,7 % (2,9 %, 43,2 %) p = 0,0299		30,8 % (3,6 %, 50,4 %) p = 0,0297 ^c	
GWPCARE1	20 mg/kg/deň	22,8 (5,4; 41,1) p = 0,0123		42,8 % (17,4 %, 60,4 %) p = 0,0032 ^c	
≥ 50 % ZNÍŽENIE VÝSKYTU KONVULZÍVNYCH ZÁCHVATOV (ANALÝZA PACIENTOV REAGUJÚCICH NA LIEČBU)					
Percentuálna hodnota ≥ 50 % reagujúcich na liečbu, hodnota p^d					
GWPCARE2	Placebo	26,2 %	65	36,6 %	41
	10 mg/kg/deň	43,9 % p = 0,0332	66	55,6 % p = 0,0623 ^c	45
	20 mg/kg/deň	49,3 % p = 0,0069	67	62,5 % p = 0,0130 ^c	40
GWPCARE1	Placebo	27,1 %	59	23,7 %	38
	20 mg/kg/deň	42,6 % p = 0,0784	61	47,5 % p = 0,0382 ^c	40

IS = 95 % interval spoľahlivosti

^a Pre štúdiu GWPCARE1 sú celkové údaje uvedené ako medián percentuálneho zníženia od počiatočnej hodnoty. Údaje pre štúdiu GWPCARE2 a pre podskupiny s klobazámom sú uvedené ako percentuálne zníženie od počiatočnej hodnoty odhadované z negatívnej binominálnej regresnej analýzy.

^b Pre štúdiu GWPCARE1 sú celkové údaje uvedené ako medián rozdielu a hodnota p z Wilcoxonovho dvojvýberového (*rank-sum*) testu. Údaje pre štúdiu GWPCARE2 a pre podskupiny s klobazámom sú odhadované z negatívnej binominálnej regresnej analýzy.

^c Nominálna hodnota p.

^d Celková p-hodnota sa zakladá na Cochranovom-Mantelovom-Haenszelovom teste. Nominálne hodnoty p pre podskupiny s klobazámom sa zakladajú na logistickej regresnej analýze.

Ďalšie sekundárne hodnoty výsledkov v podskupine pacientov súbežne liečených klobazámom

Kanabidiol sa spájal so zvýšením percentuálnej hodnoty osôb so 75 % alebo väčším znížením frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov počas liečebného obdobia v každom skúšaní (36 % pre 10 mg/kg/deň kanabidiolu, 25 % pre každú skupinu s 20 mg/kg/deň kanabidiolu, 10 % až 13 % pre placebo).

V každom skúšaní mali pacienti dostávajúci kanabidiol väčšie percentuálne zníženie výskytu celkových epileptických záchvatov v porovnaní s placebom (66 % pre 10 mg/kg/deň, 54 % až 58 %

pre 20 mg/kg/deň, 27 % až 41 % pre placebo; $p = 0,0003$ pre 10 mg/kg/deň a $p = 0,0341$ a $0,0211$ pre 20 mg/kg/deň oproti placebo).

Ošetrojúci a pacienti hlásili výraznejšie zlepšenie celkového stavu merané skóre celkového dojmu o zmene pri poslednom vyšetrení pri oboch dávkach kanabidiolu (73 % pre 10 mg/kg/deň, 62 % až 77 % pre 20 mg/kg/deň, 30 % až 41 % pre placebo; $p = 0,0009$ pre 10 mg/kg/deň a $p = 0,0018$ a $0,0136$ pre 20 mg/kg/deň oproti placebo).

V porovnaní s placebom sa kanabidiol spájal so zvýšením počtu dní bez konvulzívnych záchvatov počas liečebného obdobia v každom skúšaní, čo zodpovedá 2,7 dňom za 28 dní (10 mg/kg/deň) a 1,3 až 2,2 dňom za 28 dní (20 mg/kg/deň).

Dospelá populácia

Populáciu s DS v štúdiách GWPCARE2 a GWPCARE1 tvorili prevažne pediatrickí pacienti s len 5 dospelými pacientami, ktorí mali 18 rokov (1,6 %) a preto sa pre dospelú populáciu s DS zistilo len obmedzené množstvo údajov o účinnosti a bezpečnosti.

Odpoveď závislá od dávky

Pri danej skutočnosti, že v štúdiách LGS a DS nedošlo ku konzistentnej odpovedi závislej od dávky medzi 10 mg/kg/deň a 20 mg/kg/deň, sa má kanabidiol na začiatku liečby titrovať na odporúčanú udržiavaciu dávku 10 mg/kg/deň (pozri časť 4.2). U jednotlivých pacientov sa môže na základe pomeru prínosu a rizika zvážiť titrácia až do výšky maximálnej dávky 20 mg/kg/deň (pozri časť 4.2).

Údaje z otvorenej štúdie

V rámci oboch randomizovaných LGS štúdií bolo 99,5 % pacientov ($N = 366$), ktorí dokončili štúdie, zahrnutých do dlhodobej, otvorenej, predĺženej (OLE) štúdie (GWPCARE5). V podskupine pacientov s LGS súbežne liečených klobazámom počas 37 až 48 týždňov ($N = 168$) bol medián percentuálneho zníženia frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom oproti počiatočnému stavu 71 % počas 1. – 12. týždňa ($N = 168$), pričom táto hodnota sa udržala do 37. – 48. týždňa s mediánom percentuálneho zníženia frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom oproti počiatočnému stavu 62 %.

V rámci oboch randomizovaných DS štúdií bolo 97,7 % pacientov ($N = 315$), ktorí dokončili štúdie, zahrnutých do GWPCARE5. V podskupine pacientov s DS súbežne liečených klobazámom počas 37 až 48 týždňov ($N = 148$) bol medián percentuálneho zníženia frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov oproti počiatočnému stavu 64 % počas 1. – 12. týždňa ($N = 148$), pričom táto hodnota sa udržala do 37. – 48. týždňa s mediánom percentuálneho zníženia frekvencie výskytu konvulzívnych záchvatov oproti počiatočnému stavu 58 %.

Adjuvantná liečba pacientov s komplexom tuberóznej sklerózy (TSC)

Účinnosť kanabidiolu (25 a 50 mg/kg/deň) pri adjuvantnej liečbe záchvatov spojených s TSC sa hodnotila v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami (GWPCARE6). Štúdia pozostávala zo 4-týždňového začiatočného obdobia, 4-týždňového titračného obdobia a 12-týždňového udržiavacieho obdobia (16-týždňové obdobie liečby a primárneho hodnotenia).

Priemerný vek skúmanej populácie bol 14 rokov a všetci pacienti okrem jedného počas štúdie súbežne užívali jedno alebo viacero antiepileptík. Najčastejšie používanými antiepileptikami (> 25 % pacientov) boli valproát (45 %), vigabatrín (33 %), levetiracetam (29 %) a klobazám (27 %).

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola zmena v počte záchvatov spojených s TSC počas obdobia liečby (udržiavacia liečba a titrácia) v porovnaní so začiatočnou hodnotou pre skupinu s kanabidiolom v porovnaní s placebom. Záchvaty spojené s TSC sa definovali ako fokálne motorické záchvaty bez poruchy vedomia alebo bdelosti, fokálne záchvaty s poruchou vedomia alebo bdelosti, fokálne záchvaty vyvíjajúce sa na bilaterálne generalizované konvulzívne záchvaty a generalizované záchvaty (tonicko-klonické, tonické, klonické alebo atonické záchvaty). Kľúčovými sekundárnymi cieľovými

ukazovateľmi boli pomer pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie záchvatov spojených s TSC, celkový dojem pacienta/ošetrojúceho o zmene (*Subject/Caregiver Global Impression of Change*) pri poslednom vyšetrení a percentuálna zmena celkovej frekvencie záchvatov od začiatočného stavu.

Pre kanabidiol v dávke 50 mg/kg/deň sa preukázalo, že má podobnú úroveň zníženia výskytu záchvatov ako dávka 25 mg/kg/deň. Táto dávka sa však spájala so zvýšenou mierou výskytu nežiaducich reakcií v porovnaní s 25 mg/kg/deň, a preto je maximálna odporúčaná dávka 25 mg/kg/deň.

Tabuľka 6 zahŕňa primárny cieľový ukazovateľ percentuálneho zníženia záchvatov spojených s TSC oproti začiatočnej hodnote a kľúčové sekundárne hodnoty podielu pacientov s najmenej 50 % znížením frekvencie záchvatov spojených s TSC pre maximálnu odporúčanú dávku 25 mg/kg/deň.

Tabuľka 6: Primárne a kľúčové sekundárne koncové ukazovatele ≥ 50 % pacientov s odpoveďou na liečbu v štúdiu TSC (celková populácia pacientov)

	Štúdia GWPCARE6	
	Kanabidiol 25 mg/kg/deň (n = 75)	Placebo (n = 76)
Primárny cieľový ukazovateľ – percentuálne zníženie frekvencie záchvatov spojených s TSC^a		
Epileptické záchvaty spojené s TSC % zníženie od začiatočného stavu	48,6 %	26,5 %
Percentuálne zníženie v porovnaní s placebom		
	30,1 %	
95 % IS	13,9 %; 43,3 %	
Hodnota p	0,0009	
Kľúčový sekundárny cieľový ukazovateľ - ≥ 50 % ZNÍŽENIE záchvatov spojených s TSC (ANALÝZA PACIENTOV S ODPOVEĎOU NA LIEČBU)		
Percentuálna hodnota pacientov s ≥ 50 % znížením	36 %	22,4 %
Hodnota p ^b	0,0692	

IS = 95 % interval spoľahlivosti.

^a Údaje pre štúdiu GWPCARE6 sú uvedené ako percentuálne zníženie od začiatočnej hodnoty odhadované z negatívnej binominálnej regresnej analýzy.

^b Celková p-hodnota sa zakladá na Cochranovom-Mantelovom-Haenszelovom teste.

Analýza podskupín s liečbou alebo bez liečby klobazámom

V štúdiu GWPCARE6 súbežne užívalo klobazám 22,7 % pacientov s TSC v skupine s dávkou 25 mg/kg/deň a 32,9 % v skupine s placebom. Výsledky analýzy podskupín podľa používania klobazámu preukázali aditívne antikonvulzívne účinky kanabidiolu v prítomnosti klobazámu.

Na základe negatívnej binomickej regresnej analýzy došlo v podskupine pacientov liečených súbežne klobazámom u pacientov užívajúcich kanabidiol v dávke 25 mg/kg/deň k 61,1 % zníženiu frekvencie záchvatov spojených s TSC od východiskovej hodnoty v porovnaní s 27,1 % znížením v skupine s placebom. V porovnaní s placebom bolo užívanie kanabidiolu spojené s 46,6 % znížením (nominálna hodnota p = 0,0025) záchvatov spojených s TSC (95 % IS: 20,0 %, 64,4 %).

Na základe negatívnej binomickej regresnej analýzy došlo v podskupine pacientov liečených bez súbežného užívania klobazámu u pacientov užívajúcich kanabidiol v dávke 25 mg/kg/deň k 44,4 % zníženiu frekvencie záchvatov spojených s TSC od východiskovej hodnoty v porovnaní s 26,2 % znížením záchvatov v skupine s placebom. V porovnaní s placebom bolo užívanie kanabidiolu spojené

s 24,7 % znížením (nominálna hodnota $p = 0,0242$) záchvatov spojených s TSC (95 % IS: 3,7 %, 41,1 %).

Ďalšie sekundárne hodnoty výsledkov výskumu kanabidiolu v dávke 25 mg/kg/deň (celková populácia pacientov)

Kanabidiol sa spájal so zvýšením percenta osôb (16,0 %), u ktorých došlo k 75 % alebo väčšiemu zníženiu frekvencie záchvatov spojených s TSC počas liečebného obdobia v porovnaní so skupinou s placebom (0 %).

U pacientov dostávajúcich kanabidiol bolo vyššie percentuálne zníženie celkových záchvatov (48,1 %) v porovnaní s placebom (26,9 %).

Ošetrojúci a pacienti hlásili skóre celkového dojmu o zmene (*Global Impression of Change*) pri poslednom vyšetrení. U 68,6 % pacientov v skupine s kanabidiolom oproti 39,5 % v skupine s placebom sa vyskytlo zlepšenie.

V porovnaní s placebom sa kanabidiol počas liečebného obdobia spájal so zvýšením počtu dní bez záchvatov spojených s TSC, ktoré zodpovedalo 2,82 dňom za 28 dní.

Účinok kanabidiolu na infantilné/epileptické kŕče spojené s TSC sa úplne nevyhodnotil.

Údaje z otvorenej štúdie

Z 201 pacientov, ktorí ukončili štúdiu GWPCARE6, bolo 99,0 % (199 pacientov) zahrnutých do otvorenej, predĺženej štúdie. Medián modálnej dávky bol 25 mg/kg/deň a medián obdobia liečby bol 90 týždňov (rozsah: 2,6 – 209 týždňov). V otvorenej, predĺženej štúdii bol medián percentuálneho zníženia frekvencie záchvatov spojených s TSC od začiatocnej hodnoty 54 % počas týždňov 1 - 12 ($N = 199$), ktorý sa udržal do týždňov 85 - 96 ($N = 98$), s mediánom percentuálneho zníženia frekvencie záchvatov súvisiacich s TSC od začiatocnej hodnoty 75 %.

Zneužitie

V štúdii potenciálu zneužitia vyvolalo akútne podávanie kanabidiolu drogovo nezávislým dospelým, ktorí rekreačne používali omamné látky v terapeutických a supratherapeutických dávkach, slabé reakcie pozitívneho subjektívneho merania ako je obľúbenosť lieku alebo ochota opätovného užitia lieku. V porovnaní s dronabinolom (syntetický THC) a alprazolamom má kanabidiol nízky potenciál pre zneužitie.

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s kanabidiolom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe epileptických záchvatov spojených s LGS, DS a TSC (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Štúdia GWPCARE6 vykonaná u pacientov s TSC zahŕňala 8 detí vo veku medzi 1 a 2 rokmi v rámci všetkých liečebných skupín. Aj keď sú údaje limitované, pozorovaná účinnosť liečby a znášanlivosť boli podobné hodnotám pozorovaným u pacientov vo veku 2 roky a starších; účinnosť, bezpečnosť a farmakokinetické vlastnosti u detí vo veku < 2 roky však neboli stanovené (pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kanabidiol sa rýchlo dostáva do plazmy s časom do maximálnej plazmatickej koncentrácie 2,5 - 5 hodín pri ustálenom stave.

Ustálené plazmatické koncentrácie sa dosahujú do 2 – 4 dní pri dávkovaní dvakrát denne na základe koncentrácií pred podávaním (C_{min}). Rýchle dosiahnutie ustáleného stavu súvisí s multifázickým eliminačným profilom lieku, pri ktorom konečná eliminácia predstavuje len malú časť klírensu lieku.

U zdravých dobrovoľníkov zvýšilo súbežné podávanie kanabidiolu (750 alebo 1 500 mg) s jedlom s vysokým obsahom tukov/kalórií rýchlosť a rozsah absorpcie (5-násobné zvýšenie hodnoty C_{max} a 4-násobné zvýšenie hodnoty AUC) a znížilo celkovú variabilitu expozície v porovnaní so stavom nalačno u zdravých dobrovoľníkov. Aj keď je účinok mierne slabší pri jedle s nízkym obsahom tukov/kalórií, zvýšenie expozície je ešte vždy výrazné (hodnota C_{max} o 4-násobok, hodnota AUC o 3-násobok). Okrem toho užívanie kanabidiolu s kravským mliekom zvýšilo expozíciu o približne 3-násobok pre hodnotu C_{max} a 2,5-násobok pre hodnotu AUC. Užívanie kanabidiolu s alkoholom tiež spôsobilo zvýšenú expozíciu kanabidiolu s hodnotou AUC o 63 % vyššou.

V randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach nebolo načasovanie dávky kanabidiolu obmedzené s ohľadom na časy príjmu jedla. Preukázalo sa, že jedlo s vysokým obsahom tukov u pacientov zvýšilo biologickú dostupnosť kanabidiolu (3-násobne). Toto zvýšenie bolo stredné, keď prandiálny stav nebol úplne známy, t.j. 2,2-násobné zvýšenie relatívnej biologickej dostupnosti.

Na minimalizáciu variability biologickej dostupnosti kanabidiolu u jednotlivého pacienta sa má podávanie kanabidiolu štandardizovať s ohľadom na príjem jedla vrátane ketogénnej diéty (jedlo s vysokým obsahom tukov), t.j. Epidyolex sa má užívať konzistentne s jedlom alebo bez jedla. Pri užívaní s jedlom sa má podľa možnosti zvážiť podobné zloženie jedla.

Distribúcia

In vitro bolo > 94 % kanabidiolu a jeho metabolitov I. fázy viazaných na plazmatické proteíny s uprednostňovanou väzbou na ľudský sérový albumín.

Zdanlivý distribučný objem po perorálnom podaní bol u zdravých dobrovoľníkov vysoký, v hodnotách 20 963 l až 42 849 l, a vyšší ako celkový obsah vody v tele, čo naznačuje rozsiahlu distribúciu kanabidiolu.

Biotransformácia a eliminácia

Polčas kanabidiolu v plazme bol 56 - 61 hodín po podávaní dvakrát denne počas 7 dní zdravým dobrovoľníkom.

Metabolizmus

Kanabidiol sa rozsiahlo metabolizuje pečeňou prostredníctvom enzýmov CYP450 a enzýmov UGT. Hlavné izoformy CYP450 zodpovedné za metabolizmus kanabidiolu I. fázy sú CYP2C19 a CYP3A4. Isoformy UGT, zodpovedné za konjugáciu kanabidiolu II.fázy, sú UGT1A7, UGT1A9 a UGT2B7.

Štúdie u zdravých dobrovoľníkov preukázali, že v porovnaní s rozsiahlymi metabolizérmi neexistujú žiadne významné rozdiely v plazmatickej expozícii kanabidiolu u intermediátov CYP2C19 a ultrarýchlych metabolizérov.

Metabolity I. fázy identifikované v štandardných analýzach *in vitro* boli 7-COOH-CBD, 7-OH-CBD a 6-OH-CBD (menej významný cirkulujúci metabolit).

Po viacnásobnom podaní kanabidiolu cirkuluje na základe hodnôt AUC metabolit 7-OH-CBD (aktívny v predklinických modeloch epileptického záchvatu) v ľudskej plazme v nižších koncentráciách ako materský liek kanabidiol (~ 40 % expozície CBD).

Vylučovanie

Plazmatický klírens kanabidiolu po jednorazovej dávke 1 500 mg kanabidiolu je 1 111 l/h. Kanabidiol sa eliminuje hlavne metabolizovaním v pečeni a črevách a vylučuje sa v stolici, s menej významnou cestou obličkového klírensu materského lieku.

Kanabidiol vzájomne nepôsobí s hlavnými obličkovými a pečegovými transportérmi spôsobom, ktorý by mohol mať za následok významné liekové interakcie.

Linearita

Hodnoty $C_{\max}$ a AUC kanabidiolu sú v rámci terapeutického rozsahu dávok (10 – 25 mg/kg/deň) takmer úmerné dávke. Po jednorazovom podaní sa expozícia v rámci rozsahu 750 – 6 000 mg zvyšuje menej ako úmerne dávke, čo naznačuje, že absorpcia kanabidiolu by mohla byť saturabilná. Podávanie opakovaných dávok pacientom s TSC tiež naznačilo, že absorpcia je saturateľná pri dávkach 25 mg/kg/deň.

Farmakokinetické vlastnosti v osobitných skupinách pacientov

Účinok veku, telesnej hmotnosti, pohlavia, rasy

Populačná farmakokinetická analýza preukázala, že vek, telesná hmotnosť, pohlavie ani rasa nemajú klinicky významné účinky na expozíciu kanabidiolu.

Starší pacienti

Farmakokinetické vlastnosti kanabidiolu sa neskúmali u osôb vo veku > 74 rokov.

Pediatrickí pacienti

Farmakokinetické vlastnosti kanabidiolu sa neskúmali u pediatrických pacientov vo veku < 2 roky.

V klinických skúšaní a programe rozšíreného prístupu k lieku sa kanabidiol podával malému počtu pacientov vo veku < 2 roky s epilepsiou rezistentnou voči liečbe (vrátane LGS, DS a TSC).

Porucha funkcie obličiek

U osôb s miernou (CL_{cr} 50 až 80 ml/min), stredne závažnou (CL_{cr} 30 až < 50 ml/min) alebo závažnou (CL_{cr} < 30 ml/min) poruchou funkcie obličiek pri porovnaní s pacientami s normálnou funkciou obličiek (CL_{cr} > 80 ml/min) sa po podaní jednorazovej dávky 200 mg kanabidiolu nepozorovali žiadne účinky na hodnoty $C_{\max}$ ani AUC kanabidiolu. Pacienti v konečnom štádiu ochorenia obličiek sa neskúmali.

Porucha funkcie pečene

U osôb s miernou poruchou funkcie pečene sa po podaní jednorazovej dávky 200 mg kanabidiolu nepozorovali žiadne účinky na expozíciu kanabidiolu ani metabolitom.

Osoby so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene preukazovali vyššie plazmatické koncentrácie kanabidiolu (približne 2,5 – 5,2-násobne vyššie hodnoty AUC v porovnaní so zdravými jedincami s normálnou funkciou pečene). U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa má kanabidiol používať opatrne. U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča nižšia začiatková dávka. Dávka sa má titrovať podľa pokynov v časti 4.2

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Pri LGS

U pacientov s LGS naznačoval populačný farmakokineticko-farmakodynamický model prítomnosť vzťahu expozície a účinnosti s pravdepodobnosťou dosiahnutia ≥ 50 % zníženia frekvencie výskytu epileptických záchvatov s pádom v rámci testovaného rozsahu dávky kanabidiolu (0 [placebo], 10 a 20 mg/kg/deň). Existovala významná pozitívna korelácia medzi odvodenou hodnotou AUC kanabidiolu a pravdepodobnosťou ≥ 50 % odpovede. Analýza miery reagujúcich na liečbu tiež ukázala koreláciu vo vzťahu expozície - odpovede na aktívny metabolit kanabidiolu (7-OH-CBD). Farmakokineticko-farmakodynamická analýza tiež preukázala, že systémové expozície kanabidiolu korelovali s niektorými nežiaducimi účinkami, a to zvýšenými hladinami ALT, AST, hnačkou, únavou, GGT, stratou chuti do jedla, vyrážkou a somnolenciou (pozri časť 4.8). Klobazám (samostatná

analýza) bol významným kovariantom, ktorý spôsoboval pravdepodobnosť výskytu zvýšenia hladiny GGT, zníženia stravy chuti do jedla a zvýšenia výskytu somnolencie.

Pri TSC

U pacientov s TSC neexistuje na základe cieľových ukazovateľov účinnosti vzťah medzi expozíciou a odpoveďou, pretože vyhodnocované dávky sú na hornom konci rozsahu vzťahu medzi dávkou a odpoveďou. Vzťah medzi expozíciou a odpoveďou však bol stanovený pre metabolit 7-OH-CBD vo vzťahu k zvýšeniu hladín AST. Pre CBD ani jeho metabolity sa neidentifikovali iné farmakokineticko-farmakodynamické vzťahy s ohľadom na bezpečnostné cieľové ukazovatele.

Štúdie liekových interakcií

Vyhodnotenie in vitro liekových interakcií

Kanabidiol je substrátom CYP3A4, CYP2C19, UGT1A7, UGT1A9 a UGT2B7.

Kanabidiol má potenciál inhibovať CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19 a indukovať CYP2B6 v klinicky významných koncentráciách.

Metabolit 7-COOH-CBD je v klinicky významných koncentráciách inhibítorom aktivity sprostredkovanej UGT1A1, UGT1A4 a UGT1A6 *in vitro* (pozri časť 4.5).

Kanabidiol a metabolit 7-OH-CBD vzájomne nepôsobia s hlavnými obličkovými ani pečennými absorpčnými transportérmi a preto je nepravdepodobné, že by viedli k významným liekovým interakciám: OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1, MATE2-K, OATP1B1 a OATP1B3. Kanabidiol nie je substrátom ani inhibítorom mozgových absorpčných transportérov OATP1A2 a OATP2B1.

In vitro nie sú kanabidiol a 7-OH-CBD substrátmi inhibítorov efluxných transportérov P-gp/MDR1, BCRP ani BSEP. *In vivo* údaje s everolimusom ukazujú, že kanabidiol môže mať účinok na eflux P-gp substrátov sprostredkovaný P-gp v čreve (pozri časť 4.5), ale na základe *in vivo* štúdie s midazolamom kanabidiol neinhibuje ani neindukuje CYP3A4. Metabolit 7-OH-CBD je substrátom P-gp/MDR1 a má potenciál inhibovať BCRP, OATP1B3 a OAT3.

Vyhodnotenie in vivo liekových interakcií

Štúdie liekových interakcií s antiepileptikami

Možné interakcie medzi kanabidiolom (750 mg dvakrát denne u zdravých dobrovoľníkov a 20 mg/kg/deň u pacientov) a inými antiepileptikami sa skúmali v štúdiách liekových interakcií u zdravých dobrovoľníkov a pacientov a v populačnej farmakokinetickej analýze plazmatických koncentrácií lieku placebo kontrolovaných štúdií liečby pacientov s LGS.

Kombinácia kanabidiolu s klobazámom spôsobila zvýšenie expozície aktívnemu metabolitu N-demetylklobazámu, so žiadnym účinkom na koncentráciu klobazámu. Aj keď expozícia kanabidiolu nebola používaním klobazámu nápadne ovplyvnená, hladiny účinného metabolitu 7-OH-CBD boli pri tejto kombinácii zvýšené. Preto sa môžu vyžadovať úpravy dávok kanabidiolu alebo klobazámu.

Súbežné podávanie kanabidiolu a everolimusu viedlo k zvýšeniu expozície everolimusu. Preto sa pri súbežnom používaní everolimusu a kanabidiolu môžu vyžadovať úpravy dávky a sledovanie terapeutickú hladiny everolimusu.

In vivo interakcie pre klobazám, everolimus a iné súbežne používané antiepileptiká sú zhrnuté v tabuľke nižšie.

Tabuľka 7: Liekové interakcie medzi kanabidiolom a súbežnými antiepileptikami

Súbežné antiepileptiká	Vplyv antiepileptika na kanabidiol	Vplyv kanabidiolu na antiepileptikum
Klobazám	Žiadny účinok na hladiny kanabidiolu. Interakcie vedúce k zvýšeniu expozície aktívnemu metabolitu 7-OH-CBD v štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi. ^a	Žiadny účinok na hladiny klobazámu. Interakcie vedúce k približne 3-násobnému zvýšeniu expozície metabolitu N-demetylklobazámu. ^b
Valproát	Žiadny účinok na CBD alebo jeho metabolity.	Žiadny účinok na expozíciu kyseliny valproovej ani na expozíciu jej domnelého hepatotoxického metabolitu kyseliny 2-propyl-4-penténovej (4-én-VPA).
Stiripentol	Žiadny účinok na hladiny kanabidiolu. Interakcie vedúce k zníženiu (približne o 30 %) hodnôt C_{max} a AUC aktívneho metabolitu 7-OH-CBD v skúšaní so zdravými dobrovoľníkmi a pacientami s epilepsiou.	Interakcie vedúce k približne 28 % zvýšeniu hodnoty C_{max} a 55 % zvýšeniu hodnoty AUC v štúdiu so zdravými dobrovoľníkmi a zvýšeniu hodnoty C_{max} o 17 % a hodnoty AUC o 30 % u pacientov.
Everolimus	Účinok everolimusu na kanabidiol sa nehodnotil.	Súbežné podávanie kanabidiolu (12,5 mg/kg dvakrát denne) s everolimusom (5 mg) viedlo v štúdiu so zdravými dobrovoľníkmi k približne 2,5-násobnému zvýšeniu expozície pre hodnoty C_{max} aj AUC.

^a priemerné zvýšenia hodnoty AUC o 47 % a hodnoty C_{max} o 73 %.

^b na základe hodnôt C_{max} a AUC.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Mutagenita a karcinogenita

V štúdiách karcinogenity u myši zvýšilo perorálne podávanie kanabidiolu (0 [voda], 0 [nosič], 30, 100, alebo 300 mg/kg/deň) po dobu 2 rokov výskyt benígnych hepatocelulárnych adenómov u samcov pri všetkých testovaných dávkach a u samic pri najvyššej testovanej dávke. Pri najvyššej hodnotenej dávke boli plazmatické expozície (AUC) kanabidiolu u myši približne 3-násobne vyššie ako predpokladaná expozícia u ľudí pri maximálnej odporúčanej dávke u ľudí (*maximum recommended human dose*, MRHD) 25 mg/kg/deň.

V 104-týždňovej štúdiu karcinogenity u potkanov perorálne podávanie kanabidiolu (0 [voda], 0 [nosič], 15, 50 a 150 mg/kg/deň) zvýšilo výskyt fokálnej hyperplázie Leydigových buniek a adenómu Leydigových buniek pri všetkých úrovniach dávky u samcov. Pri najnižšej hodnotenej dávke boli expozície kanabidiolu v plazme (AUC) nižšie ako 1-násobok klinickej expozície v plazme pri MRHD. Jeden karcinóm Leydigových buniek sa vyskytol u samca pri najvyššej hodnotenej dávke, čo zodpovedá úrovni expozície 10-násobku klinickej expozície v plazme pri MRHD. Nádory Leydigových buniek u potkanov sa vo všeobecnosti považujú limitovane relevantné pre ľudí.

V štúdiách genotoxicity sa nezaznamenali žiadne mutagénne ani klastogénne účinky kanabidiolu alebo hlavných metabolitov u ľudí.

Reprodukčná toxicita

Kanabidiol: Nepozorovali sa žiadne nežiaduce reakcie na samčiu ani samičiu fertilitu ani na reprodukčnú schopnosť u potkanov pri dávkach až 250 mg/kg/deň (približne 14-násobok MRHD 25 mg/kg/deň u ľudí).

Kanabidiol: V štúdii embryofetálneho vývoja vykonanej na králikoch sa vyhodnocovali dávky 50, 80 alebo 125 mg/kg/deň. Úroveň dávky 125 mg/kg/deň viedla k zníženiu telesnej hmotnosti plodov a zvýšeniu výskytu fetálnych štrukturálnych variácií spojených s materskou toxicitou. Materské plazmatické expozície kanabidiolu pri hladine bez pozorovaného nežiaduceho účinku (*No Observed Adverse Effect Level*, NOAEL) pre embryofetálnu vývojovú toxicitu u králikov boli menšie ako u ľudí pri MRHD 25 mg/kg/deň.

Kanabidiol: V štúdiách embryofetálneho vývoja u potkanov sa vyhodnocovali dávky 75, 150 alebo 250 mg/kg/deň. Pri vysokých dávkach sa pozorovala embryofetálna mortalita bez účinkov na zánik implantovania súvisiacich s liečbou pri nízkych alebo stredných dávkach. NOAEL zodpovedala materským plazmatickým expozíciám (AUC) kanabidiolu približne 13-násobne vyšším ako je očakávaná expozícia u ľudí pri MRHD 25 mg/kg/deň.

7-COOH-CBD: U potkanov sa v štúdii EFD hodnotili dávky 25, 50 a 100 mg/kg/deň 7-COOH-CBD. Pri najvyššej testovanej dávke sa pozorovali embryofetálne malformácie a variácie. Nepozorovali sa žiadne iné účinky na matku alebo vývin súvisiace s liečivom. Najvyššia dávka bez účinku na embryofetálnu toxicitu u potkanov bola spojená s expozíciou 7-COOH-CBD v plazme matky (AUC) približne 4-krát vyššou ako je očakávaná expozícia u ľudí pri MRHD 25 mg/kg/deň.

Kanabidiol: Štúdie pre- a postnatálneho vývoja sa vykonali na potkanoch pri dávkach 75, 150 alebo 250 mg/kg/deň. Pri dávkach ≥ 150 mg/kg/deň sa u potomkov pozorovalo zníženie rastu, oneskorenie sexuálne vyzretie, zmeny správania (znížená aktivita) a nežiaduce účinky na vývoj samčích reprodukčných orgánov (malé semenníky u dospelých potomkov) a fertilitu. NOAEL zodpovedala približne 7-násobným materským plazmatickým expozíciám kanabidiolu v porovnaní s ľudskými expozíciami pri MRHD 25 mg/kg/deň.

7-COOH-CBD: Štúdia prenatalného a postnatalného vývinu sa vykonala na potkanoch v dávkach 20, 40 alebo 75 mg/kg/deň 7-COOH-CBD. Podávanie týchto dávok bolo dobre tolerované a nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky u matiek zvierat ani u následného potomstva až do dospelosti. Dávka bez účinku na prenatalnú a postnatalnú vývinovú toxicitu u potkanov bola spojená s expozíciou 7-COOH-CBD v plazme matky približne 7-krát vyššou ako u ľudí pri MRHD 25 mg/kg/deň.

Juvenilná toxicita

Kanabidiol: U mladých potkanov viedlo podávanie kanabidiolu počas 10 týždňov (subkutánne dávky 0 alebo 15 mg/kg na 4. – 6. deň po narodení s následným perorálnym podávaním 0, 100, 150 alebo 250 mg/kg na 7. – 77. deň po narodení) k zvýšeniu telesnej hmotnosti, oneskorenému samčiemu sexuálnemu vyzretiu, neurobehaviorálnym účinkom, zvýšenej minerálnej hustote kostí a vakuolizácii pečenných hepatocytov. Nestanovila sa dávka bez žiadneho účinku. Najnižšia dávka spôsobujúca vývojovú toxicitu u mladých potkanov (15 mg/kg subkutánne/100 mg/kg perorálne) zodpovedala približne 4-násobným hodnotám expozície kanabidiolu (AUC) u ľudí pri MRHD 25 mg/kg/deň.

V inej štúdii sa kanabidiol podával mladým potkanom od 4. - 21. dňa po narodení (ako subkutánna injekcia) a od 22. - 50. dňa po narodení (ako intravenózna injekcia). Stanovila sa NOAEL 15 mg/kg/deň.

7-COOH-CBD: U mladých potkanov viedlo subkutánne podávanie metabolitu 7-COOH-CBD (0, 20, 40 alebo 80 mg/kg/deň) na 4. – 6. deň po narodení s následným vyživovaním sondou na 7. – 77. deň po narodení počas celkovo 10 týždňov k mortalite, oftalmickým abnormalitám a zrýchlenému sexuálnemu vyzretiu samíc pri dávke ≥ 40 mg/kg/deň a pri dávke 80 mg/kg/deň k dlhodobému neurobehaviorálnemu poškodeniu (zvýšená pohybová aktivita, znížená habituácia reakcie na

vyľakanie zvukom a znížená inhibícia predbežného impulzu, oneskorené učenie sa v bludisku) a poškodeniu reprodukčnej funkcie (narušená cyklickosť ruje, znížená koncentrácia spermií a zvýšený počet abnormálnych spermií, znížené indexy párenia, fertility a fekundity, zvýšená častosť predimplantačnej straty), zníženej hmotnosti mozgu a zníženej hustote kostí. Dávka bez účinku sa stanovila na 20 mg/kg/deň, súvisela s expozíciami 7-COOH-CBD (AUC) približne rovnocennými ako u ľudí pri MRHD kanabidiolu 25 mg/kg/deň.

Zneužitie

Štúdie na zvieratách týkajúce sa zneužitia lieku ukazujú, že kanabidiol nespôsobuje reakcie v správaní podobné kanabinoidom, vrátane generalizácie na delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) v diskriminačnej liekovej štúdii. Kanabidiol tiež nespôsobuje samopodávanie u zvierat, čo naznačuje, že nevyvoláva uspokojivé účinky.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

rafinovaný sezamový olej
bezvodý etanol
sukralóza (E955)
jahodová príchuť (obsahujúca benzylalkohol)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

Použite do 12 týždňov po prvom otvorení fľaše.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z jantárového skla (typ III) s detským bezpečnostným a poistným skrutkovacím uzáverom (polypropylén).

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok je k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach balenia:

100 ml (1 × 100 ml fľaša) s 2 × 5 ml a 2 × 1 ml kalibrovanými perorálnymi dávkovacími striekačkami (piest z HDPE a polypropylénový valec) a dvoma nadstavcami na fľašu (LDPE).

300 ml (3 × 100 ml fľaša) s 2 × 5 ml a 2 × 1 ml kalibrovanými perorálnymi dávkovacími striekačkami (piest z HDPE a polypropylénový valec) a tromi nadstavcami na fľašu (LDPE).

5 ml striekačky sú odstupňované po 0,1 ml a 1 ml striekačky sú odstupňované po 0,05 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Môžu sa použiť silikónové nazogastrické sondy s dĺžkou viac ako 50 cm a maximálne 125 cm a priemerom viac ako 5 FR a maximálne 12 FR. Treba sa vyhnúť používaniu silikónových nazogastrických sond s dĺžkou 50 cm alebo kratších a priemerom 5 FR alebo menej. Môžu sa použiť gastrické silikónové sondy s dĺžkou 0,8 až 4 cm a priemerom 12 FR až 24 FR. Nesmú sa používať polyvinylchloridové ani polyuretánové sondy.

Po podaní sa má enterálna vyživovacia sonda vypláchnuť aspoň raz vodou izbovej teploty. Ak sa podáva viac ako jeden liek, sonda sa má medzi podaním každého lieku vypláchnuť. Odporúča sa vyplachovací objem približne 5-násobne väčší ako je plniaci objem sondy (s minimálne 3 ml pri najkratších/najužších sondách až maximálne 20 ml pri najdlhších/najväčších sondách). U pacientov s obmedzeniami príjmu tekutín môže byť potrebná úprava vyplachovacieho objemu.

Pri enterálnych sondách so spojkami ENFit® je potrebné použiť striekačky a nadstavce na fľaše kompatibilné s ENFit. Na maximalizáciu presnosti dávky sa majú pri dávkach ≤ 1 ml použiť 1 ml striekačky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
5th Floor
Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
D04 E5W7
Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/19/1389/001
EU/1/19/1389/002

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. september 2019
Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. júla 2024

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <https://www.ema.europa.eu>.

PRÍLOHA II

- A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA)
ZODPOVEDNÝ(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE**
- B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
VÝDAJA A POUŽITIA**
- C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE**
- D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU**

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže

Jazz Pharmaceuticals Netherlands B.V.,
Stationsplein 13A, 3818 LE, Amersfoort
Holandsko

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

- **Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti (Periodic safety update reports, PSUR)**

Požiadavky na predloženie PSUR tohto lieku sú stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

- **Plán riadenia rizík (RMP)**

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2 registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

- na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,
- vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

A. OZNAČENIE OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Perorálny roztok – škatuľa obsahujúca 100 ml (1 x 100 ml fľaša) perorálny roztok

1. NÁZOV LIEKU

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok
kanabidiol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg kanabidiolu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje rafinovaný sezamový olej, etanol a zložky jahodovej príchute (obsahujúce benzylalkohol).

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorálny roztok

Jedna 100 ml fľaša

Dve 1 ml perorálne striekačky s nadstavcom na fľašu

Dve 5 ml perorálne striekačky s nadstavcom na fľašu

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĎADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Nepoužitú časť lieku zlikvidujte 12 týždňov po prvom otvorení.

Dátum prvého otvorenia:

___/___/___

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ****11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
5th Floor
Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
D04 E5W7
Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/19/1389/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA**15. POKYNY NA POUŽITIE****16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME**

epidyolex

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC
SN
NN

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Perorálny roztok – škatuľa obsahujúca 300 ml (3 x 100 ml fľaša) perorálny roztok

1. NÁZOV LIEKU

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok
kanabidiol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg kanabidiolu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje rafinovaný sezamový olej, etanol a zložky jahodovej príchute (obsahujúce benzylalkohol).

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorálny roztok

3 × 100 ml fľaša

Dve 1 ml perorálne striekačky s nastavcom na fľašu

Dve 5 ml perorálne striekačky s dvomi nastavcami na fľašu

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĎADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Nepoužitú časť lieku zlikvidujte 12 týždňov po prvom otvorení.

Dátum prvého otvorenia:

___/___/___

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ****11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
5th Floor
Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
D04 E5W7
Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/19/1389/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA**15. POKYNY NA POUŽITIE****16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME**

epidyolex

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC
SN
NN

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE**FEAŠA****1. NÁZOV LIEKU**

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok
kanabidiol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg kanabidiolu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje rafinovaný sezamový olej, etanol a zložky jahodovej príchute (obsahujúce benzylalkohol).

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 ml

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĎADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ**8. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP

Nepoužitú časť lieku zlikvidujte 12 týždňov po prvom otvorení.

Dátum prvého otvorenia:

____/____/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
5th Floor
Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
D04 E5W7
Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/19/1389/001 (balenie s 1 × 100 ml fľašou)
EU/1/19/1389/002 (balenie s 3 × 100 ml fľašou)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE, KÓDY ODBERU A LIEKU

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok kanabidiol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1. Čo je Epidyolex a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vy alebo pacient vedieť pred užitím Epidyolexu
3. Ako máte vy alebo pacient užívať Epidyolex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Epidyolex
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Epidyolex a na čo sa používa

Epidyolex obsahuje kanabidiol, liek, ktorý sa môže používať na liečbu epilepsie, ochorenia, pri ktorom má človek záchvaty alebo kŕče.

Epidyolex sa používa v kombinácii s klobazámom alebo s klobazámom a inými antiepileptikami na liečbu záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri dvoch zriedkavých ochoreniach nazývaných Dravetovej syndróm a Lennox-Gastautov syndróm. Môže sa používať u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku najmenej 2 roky.

Epidyolex sa tiež používa v kombinácii s inými antiepileptikami na liečbu záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri genetickej poruche nazývanej komplex tuberóznej sklerózy (TSC). Môže sa používať u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku najmenej 2 roky.

2. Čo potrebujete vy alebo pacient vedieť pred užitím Epidyolexu

Neužívajte Epidyolex

- ak ste alergický na kanabidiol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak váš lekár zistí, že máte určité neobvyklé výsledky krvných pečeňových testov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Epidyolex alebo počas liečby sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- máte alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou, pretože váš lekár môže zmeniť dávku Epidyolexu alebo sa môže rozhodnúť, že Epidyolex nie je pre vás vhodný. Predtým, ako začnete užívať tento liek a počas liečby vám môže váš lekár urobiť krvné testy na kontrolu pečene, pretože Epidyolex môže pôsobiť problémy s pečeňou. Ak vám pečeň nepracuje správne, môže byť potrebné, aby ste ukončili liečbu.

- ak u seba spozorujete neobvyklé zmeny nálady alebo správania, alebo máte sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. **Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte rovno do nemocnice** (pozri časť 4).
- Epidyolex u vás môže spôsobiť ospalosť. Nevedzte vozidlá, neobsluhujte stroje ani sa nezúčastňujte na aktivitách, ktoré si vyžadujú pozornosť a presnú kontrolu, ako je bicyklovanie, až kým nezistíte, aký má na vás Epidyolex účinok.
- ak náhle prestanete užívať Epidyolex (pozri časť 3).
- ak sa počas užívania Epidyolexu u vás vyskytnú častejšie epileptické záchvaty alebo ak sa u vás vyskytne závažný epileptický záchvat. **Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte rovno do nemocnice.**
- ak u vás dôjde k strate telesnej hmotnosti alebo nie ste schopný pribrať. Váš lekár bude sledovať vašu telesnú hmotnosť a vyhodnotí, či má liečba Epidyolexom pokračovať.

Deti a dospievajúci

Epidyolex sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky.

Iné lieky a Epidyolex

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Užívanie Epidyolexu s určitými inými liekmi môže spôsobiť vedľajšie účinky, môže mať vplyv na účinok iných liekov alebo na účinok Epidyolexu. Nezačínajte ani neprestávajte užívať ďalšie lieky bez toho, aby ste sa predtým poradili s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov, pretože môže byť potrebná úprava dávky:

- iné lieky na epilepsiu ako je karbamazepín, klobazám, lorazepam, stiripentol a valproát, ktoré sa používajú na liečbu záchvatov,
- ďalšie lieky používané na liečbu TSC, vrátane everolimu alebo takrolimu,
- lieky používané na liečbu refluxu kyseliny (pálenie záhy alebo spätný tok kyseliny) ako je omeprazol,
- mitotán (liek používaný na liečbu nádorov nadobličiek),
- morfin alebo diflunisal (lieky na liečbu bolesti),
- efavirenz (liek na liečbu HIV/AIDS),
- teofylín (liek na liečbu astmy),
- kofeín (liek pre deti, ktoré potrebujú pomoc pri dýchaní),
- propofol (anestetikum používané u ľudí podstupujúcich chirurgický zákrok),
- simvastatín, fenofibrát, gemfibrozil (lieky používané na zníženie hladiny cholesterolu/tukov),
- enzalutamid (liek na liečbu rakoviny prostaty),
- Ľubovník bodkovaný (*Hypericum perforatum*) (rastlinný liek na liečbu miernej úzkosti),
- lieky na liečbu bakteriálnych infekcií ako sú rifampín, klaritromycín a erytromycín.

Epidyolex a jedlo

Vždy užívajte Epidyolex podľa pokynov vášho lekára a pravidelne buď s jedlom alebo bez jedla, vrátane jedla s vysokým obsahom tukov (ako pri ketogénnej diéte). Ak užívate Epidyolex s jedlom, mali by ste podľa možnosti prijímať podobný typ jedla (napr. podobný obsah tukov). (Pozri tiež časť 3, Ako užívať Epidyolex).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Epidyolex nepoužívajte počas tehotenstva, pokiaľ lekár nerozhodol, že prínos prevyšuje nad možnými rizikami.

Počas užívania Epidyolexu nedojčíte, pretože Epidyolex sa môže nachádzať v materskom mlieku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidiel, obsluhovaní strojov alebo ak sa deti podieľajú na aktivitách ako je bicyklovanie alebo iné športy, pretože sa vy môžete po užití tohto lieku cítiť ospalý.

Nevedzte vozidlá, neobsluhujte stroje ani sa nezúčastňujte na aktivitách, ktoré si vyžadujú pozornosť a presnú kontrolu, až kým sa nestanoví, či vaša schopnosť podieľať sa na takýchto aktivitách nie je ovplyvnená.

Epidyolex obsahuje sezamový olej, alkohol (etanol), zložky jahodovej príchute (obsahujúce benzylalkohol).

Epidyolex obsahuje rafinovaný sezamový olej, ktorý môže zriedkavo vyvolať závažné alergické reakcie.

Jeden ml Epidyolexu obsahuje 79 mg etanolu, čo zodpovedá 10 % v/v bezvodného etanolu, t.j. až 691,3 mg etanolu/na maximálnu jednorazovú dávku Epidyolexu (12,5 mg/kg) pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg (9,9 mg etanolu/kg). Pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg to zodpovedá 17 ml piva alebo 7 ml vína na dávku. Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv.

Tento liek obsahuje 0,0003 mg/ml benzylalkoholu, čo zodpovedá 0,0026 mg na maximálnu dávku Epidyolexu (Epidyolex 12,5 mg/kg na dávku pre dospelého s telesnou hmotnosťou 70 kg). Benzylalkohol môže spôsobiť alergické reakcie.

Nepoužívajte viac ako týždeň u malých detí (menej ako 3 roky), ak vám to neodporučí váš lekár alebo lekárnik.

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, ak ste tehotná alebo dojčíte, pretože vo vašom tele sa môžu hromadiť veľké množstvá benzylalkoholu a môžu spôsobiť vedľajšie účinky (nazývané „metabolická acidóza“).

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, ak máte ochorenie pečene alebo obličiek, pretože vo vašom tele sa môžu hromadiť veľké množstvá benzylalkoholu a môžu spôsobiť vedľajšie účinky (nazývané „metabolická acidóza“).

3. Ako máte vy alebo pacient užívať Epidyolex

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Epidyolex je perorálny roztok (tekutina, ktorá sa má prehltnúť). Lekár alebo lekárnik vám povedia, koľko (počet ml) Epidyolexu máte užívať každý deň, koľkokrát za deň ho máte užívať a ktorú striekačku máte použiť na dávku (1 ml alebo 5 ml).

Lekár vám vypočíta dávku podľa telesnej hmotnosti. Môžete začínať s nízkou dávkou, ktorú bude lekár časom postupne zvyšovať. Ak si nie ste istý vašou alebo ak si myslíte, že dávka by mala byť upravená, kontaktujte lekára.

Užívanie Epidyolexu s jedlom môže zvýšiť množstvo lieku, ktoré vaše telo prijme. Skúste užívať Epidyolex s ohľadom na jedlo čo najpravidelnejšie, buď s jedlom alebo bez jedla, a podľa vášho denného režimu, aby bol u vás účinok lieku zakaždým rovnaký. Ak užívate Epidyolex s jedlom, mali by ste podľa možnosti prijímať podobný typ jedla (napr. podobný obsah tukov).

V prípade potreby sa môže Epidyolex užívať cez nazogastrickú alebo gastrostomickú sondu. Váš lekár vás poučí, ako to máte urobiť. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Informujte svojho lekára, ak máte problémy s pečeňou, pretože vám možno bude musieť upraviť dávku.

Neznižuje dávku ani neprestávajúce užívať liek, kým vám to nepovie lekár.

Návod na perorálne použitie Epidyolexu


Balenie s 1 fľašou obsahuje nasledujúce časti:

- fľašu s perorálnym roztokom Epidyolexu,
- plastové vrečko obsahujúce dve 1 ml perorálne striekačky a nadstavec na fľašu,
- plastové vrečko obsahujúce dve 5 ml perorálne striekačky a nadstavec na fľašu.

Balenie s 3 fľašami obsahuje nasledujúce časti:

- tri fľaše s perorálnym roztokom Epidyolexu,
- plastové vrečko obsahujúce dve 1 ml perorálne striekačky a nadstavec na fľašu,
- plastové vrečko obsahujúce dve 5 ml perorálne striekačky a dva nadstavce na fľašu.

Náhradná striekačka každej veľkosti sa dodáva v balení pre prípad, keby sa jedna stratila alebo zničila. Pri balení s 3 fľašami sú potrebné všetky tri nadstavce z oboch balení striekačiek.




Obrázok vyššie slúži iba na ilustračné účely.

1. Otvorte vrečko obsahujúce správnu perorálnu striekačku na odmeranie dávky.

- Ak je dávka **1 ml (100 mg) alebo menej**, použite menšiu 1 ml striekačku.
- Ak je dávka **vyššia ako 1 ml (100 mg)**, použite väčšiu 5 ml striekačku.
- Ak je dávka **vyššia ako 5 ml (500 mg)**, budete musieť použiť väčšiu 5 ml striekačku viackrát. V tom prípade si dôkladne zapamätajte, koľkokrát ste naplnili striekačku (napr. zaznamenaním každej 5 ml dávky), aby ste si podali správnu dávku.

Je dôležité, aby ste na odmeranie dávky použili správnu perorálnu striekačku. Lekár alebo lekárnik vám povedia, ktorú striekačku v závislosti od predpísanej dávky máte použiť.

Podľa pokynov lekára alebo lekárnika zlikvidujte vrečko obsahujúce ďalšie striekačky a nadstavce z balenia, pokiaľ vám váš lekár alebo lekárnik nepovedal, aby ste si ponechali obe striekačky na dosiahnutie vašej konečnej dávky. V prípade predpisania balenia s 3 fľašami je potrebné ponechať si všetky tri nadstavce.




2. Odstráňte detský bezpečnostný uzáver na fľaši stlačením viečka a jeho súčasným otočením proti smeru hodinových ručičiek.



3. Nadstavec jemne vtláča do hrdla fľaše a uistite sa, aby bol úplne vsunutý. Ak nie je úplne vsunutý, môže sa uvoľniť a spôsobiť upchatie.




4. Vsuňte špičku správnej perorálnej striekačky úplne do nadstavca fľaše a s nasadenou perorálnou striekačkou otočte fľašu hore dnom.




5. Pomaly ťahajte za piest striekačky, aby ste natiahli potrebný objem (počet ml) roztoku do striekačky. Zarovnajte koniec piestu s označením vyžadovaného predpísaného objemu, ako vidno na obrázku oproti.

Ak sa v striekačke nachádza vzduchová bublina, vstrieknite tekutinu späť do fľaše, pričom fľašu držte hore dnom a zopakujte krok 5, až kým bublina nezmizne.




1 ml striekačka




5 ml striekačka

6. Otočte fľašu dole dnom a opatrne vytiahnite perorálnu striekačku z nadstavca.



7. Vložte si špičku perorálnej striekačky dovnútra líca a jemne stlačte piest na uvoľnenie lieku. Netlačte piest nasilu ani striekačku nenasmerujte do zadnej časti úst alebo hrdla.


Ak je dávka viac ako 5 ml, zopakujte kroky 4 až 7, aby ste podali zvyšnú dávku použitím 5 ml perorálnej striekačky.



8. Naskrutkujte späť pevne detský bezpečnostný uzáver na fľašu otáčaním viečka v smere hodinových ručičiek – nemusíte odstrániť nadstavec na fľašu, pretože sa zmesť pod viečko.




9. Naplňte pohár teplou mydlovou vodou a perorálnu striekačku vyčistíte natiahnutím a vytlačením vody pomocou piesta.



10. Vytiahnite piest z valca striekačky a obe časti opláchnite pod tečúcou vodou. Perorálnu striekačku nedávajte do umývačky riadu.

Vytraste všetku vodu z oboch častí a nechajte ich uschnúť na vzduchu až do ďalšieho použitia. Pred ďalším použitím sa uistite, či je perorálna striekačka úplne suchá, pretože ak sa do fľaše dostane voda, mohla by zapríčiniť zakalenie roztoku.

Ak sa roztok vo fľaši zakalí, nemení to nič na jeho účinku. Pokračujte v užívaní lieku ako obvyčajne.



Ak vy alebo váš pacient užijete viac Epidyolexu, ako máte

Ak ste možno užili viac Epidyolexu ako ste mali, okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo kontaktujte oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice a vezmite si liek so sebou. Prejavy užitia väčšieho množstva Epidyolexu, ako vám bolo určené, zahŕňajú hnačku a ospalosť.

Ak vy alebo váš pacient zabudnete užiť Epidyolex

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Ak vynecháte veľa dávok, poraďte sa so svojím lekárom ohľadne správnej dávky, ktorú máte užiť.

Ak vy alebo váš pacient prestanete užívať Epidyolex.

Neznižujte dávku ani neprestávajte užívať Epidyolex bez toho, aby ste sa o tom najprv poradili so svojím lekárom. Náhle ukončenie tejto liečby môže zhoršiť vaše záchvaty. Lekár vám vysvetlí, ako máte postupne prestať užívať Epidyolex.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť **veľmi závažné**:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb):

- U pacientov dostávajúcich Epidyolex sa hlásili vysoké hladiny pečeňových enzýmov (zvýšené hladiny transamináz) pozorované v krvných testoch, ktoré môžu byť prejavom poškodenia pečene.

Vedľajšie účinky s neznámou častotou (častota výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- Osoby užívajúce tento liek môžu mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Ak sa u vás kedykoľvek vyskytnú takéto myšlienky, kontaktujte svojho lekára.

Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky. Povedzte svojmu lekárovi, ak máte niektoré z nasledovných vedľajších účinkov:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- pocit ospalosti,
- hnačka,
- znížená chuť do jedla,
- horúčka,
- vracanie,
- pocit únavy.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb):

- záchvaty,
- zlá nálada (podráždenosť, agresivita),
- vyrážka,
- nedostatok energie,
- kašeľ,
- zápal pľúc,
- strata telesnej hmotnosti,
- nevoľnosť,
- infekcia močových ciest.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Epidyolex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na fľaši. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Ak máte vo fľaši zvyšný roztok viac ako 12 týždňov po prvom otvorení, neužívajte ho.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Epidyolex obsahuje

- Liečivo je kanabidiol. Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg kanabidiolu.
- Ďalšie zložky sú rafinovaný sezamový olej, bezvodý etanol, sukralóza a jahodová príchuť (obsahujúca benzylalkohol) (pozri časť 2).

Ako vyzerá Epidyolex a obsah balenia

Epidyolex je číry, bezfarebný až žltý perorálny roztok. Dodáva sa vo fľašiach z jantárového skla s detským bezpečnostným skrutkovacím uzáverom.

Epidyolex je k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach balenia:

100 ml (1 × 100 ml fľaša) s 2 × 5 ml a 2 × 1 ml kalibrovanými perorálnymi dávkovacími striekačkami a dvoma nadstavcami na fľašu.

300 ml (3 × 100 ml fľaša) s 2 × 5 ml a 2 × 1 ml kalibrovanými perorálnymi dávkovacími striekačkami a tromi nadstavcami na fľašu.

5 ml striekačky sú odstupňované po 0,1 ml a 1 ml striekačky po 0,05 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
5th Floor
Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
D04 E5W7
Írsko
Tel: +353 1 968 1631
e-mail: medinfo-int@jazzpharma.com

Výrobca

Jazz Pharmaceuticals Netherlands B.V.,
Stationsplein 13A, 3818 LE, Amersfoort
Holandsko
e-mail: medinfo-int@jazzpharma.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v .

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: <https://www.ema.europa.eu/>. Nájdete tam aj odkazy na ďalšie webové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.